Capítulo 3

Números Enteros Módulo m

3.1. Congruencias

Definición 22 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{Z}, m > 0$.

Se dice que a es congruente a b módulo m , lo que escribiremos

$$a \equiv b(\text{mod } m) \text{ si y sólo si } m|(a - b).$$

En caso contrario, se dice incongruentes o no congruentes, lo que anotaremos

$$a \not\equiv b(\text{mod } m).$$

Ejemplo 44

1. $8 \equiv -5(\text{mod } 13)$ ya que $13|(8 - (-5))$
2. $22 \equiv 1(\text{mod } 7)$ ya que $7|(22 - 1)$
3. $11 \equiv 1(\text{mod } 2)$ ya que $2|(11 - 1)$

Observación:

$$a \equiv b(\text{mod } m) \Leftrightarrow (\exists t \in \mathbb{Z})(a = b + tm).$$

Teorema 86 Sea $m \in \mathbb{Z}, m > 0$.

1. Para todo $a \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv a(\text{mod } m).$$

2. Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv b(\text{mod } m) \Leftrightarrow b \equiv a(\text{mod } m).$$

3. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ cualesquiera, si $a \equiv b(\text{mod } m)$ y $b \equiv c(\text{mod } m)$, entonces

$$a \equiv c(\text{mod } m).$$

Demostración:

1. Para todo $a \in \mathbb{Z}$, se tiene que $a \equiv a \pmod{m}$, pues $m|(a - a)$.
2. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, tales que

$$\begin{aligned} & a \equiv b \pmod{m} \\ \Leftrightarrow & (\exists t \in \mathbb{Z})(a = b + mt) \\ \Leftrightarrow & (\exists k \in \mathbb{Z})(b = a + mk), \quad \text{donde } k = -t \\ \Leftrightarrow & b \equiv a \pmod{m}. \end{aligned}$$

3. Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$, entonces existen $t, k \in \mathbb{Z}$, tales que

$$a = b + mt \tag{3.1}$$

$$b = c + mk, \tag{3.2}$$

luego reemplazando (3.1) en (3.2), se tiene que

$$\begin{aligned} & a = c + mt + mk \\ \Leftrightarrow & a = c + m(t + k) \\ \Leftrightarrow & a \equiv c \pmod{m}. \end{aligned}$$

□

Corolario 87 *La relación de congruencia módulo m , es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.*

Definición 23 *Sean $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z}^+$ entonces se define la clase de equivalencia de a módulo m como el conjunto de todos los números enteros congruente a “ a ” módulo m , y la denotaremos por $\bar{a}$. El número a se llama representante de la clase a .*

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\}.$$

Ejemplo 45 *Sea $m = 13$*

$$\begin{aligned} \bar{1} &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \pmod{13}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 1 + 13t, \quad t \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -25, -12, 1, 14, 27 \dots\}. \end{aligned}$$

Definición 24 *El conjunto formado por todas las clases módulo m definidas sobre $\mathbb{Z}$ es llamado el conjunto de los números enteros módulo m y se anota*

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}\}.$$

Teorema 88 *Sea $m \in \mathbb{Z}^+$, la relación de equivalencia módulo m particiona a $\mathbb{Z}$ en m clases de equivalencia, en forma más precisa tenemos que*

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m-1}\}.$$

Demostración: Sea $x \in \mathbb{Z}$, luego por el algoritmo de la división tenemos que existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq r < m$ y $x = qm + r$ que es equivalente a $x \equiv r \pmod{m}$, de este modo x pertenece a una de las clases anteriores.

Sean r, s enteros no negativos menores que m , tales que $r \equiv s \pmod{m}$, por lo tanto $r - s = mt$, de donde se obtiene que

$$0 \leq r = s + mt < m, \quad 0 \leq s < m$$

De esta manera se obtiene que $t = 0$, luego la clase es única. □

3.2. Suma en $\mathbb{Z}_m$

Teorema 89 Sea $m \in \mathbb{Z}, m > 0$. Si $\{a_1, \dots, a_n\}, \{b_1, \dots, b_n\}$ y $\{k_1, \dots, k_n\}$ son conjuntos de enteros cualesquiera, tales que $a_i \equiv b_i \pmod{m}, 1 \leq i \leq n$, entonces

$$\sum_{i=1}^n k_i a_i \equiv \sum_{i=1}^n k_i b_i \pmod{m}.$$

Demostración: Si $a_i \equiv b_i \pmod{m}$, para $1 \leq i \leq n$, entonces existen enteros $d_i, 1 \leq i \leq n$, tales que

$$a_i = b_i + d_i m, \quad 1 \leq i \leq n, \tag{3.3}$$

luego multiplicando (3.3) por k_i , para $1 \leq i \leq n$ se tiene que

$$k_i a_i = k_i b_i + (k_i d_i) m, \quad 1 \leq i \leq n,$$

así

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n k_i a_i &= \sum_{i=1}^n k_i b_i + m \sum_{i=1}^n k_i d_i \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n k_i a_i &\equiv \sum_{i=1}^n k_i b_i \pmod{m}. \end{aligned}$$

Observación: El teorema anterior nos permite definir la suma en $\mathbb{Z}_m$ como sigue:

Definición 25 Sean $\bar{a}$ y $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, se definen la suma por:

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}.$$

Teorema 90 $(\mathbb{Z}_m, +)$ es un grupo abeliano.

Ejemplo 46 Construir la tabla del grupo $(\mathbb{Z}_2, +)$:

Solución: La tabla esta dada por

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0} + \bar{0}$	$\bar{0} + \bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1} + \bar{0}$	$\bar{1} + \bar{1}$

al operar obtenemos

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

Ejemplo 47 Construir la tabla del grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$:

Solución: Al simplificar obtenemos

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$

Definición 26 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, y $n \in \mathbb{N}$, entonces se define por recurrencia la potencia aditiva n -ésima de $\bar{a}$

$$\begin{aligned} 0 \cdot \bar{a} &= \bar{0} \\ (n+1) \cdot \bar{a} &= n \cdot \bar{a} + \bar{a}; \\ \text{Además } (-n) \cdot \bar{a} &= n \cdot \overline{-a} \end{aligned}$$

Ejemplo 48 En $\mathbb{Z}_6$, calcular

1. $3 \cdot \bar{1} = 2 \cdot \bar{1} + \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3}$
2. $3 \cdot \bar{2} = \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = \bar{6} = \bar{0}$
3. $5 \cdot \bar{3} = \bar{15} = \bar{3}$

Propiedad 91 Sean $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, y $r, s \in \mathbb{Z}$, entonces

1. $(r+s) \cdot \bar{a} = r \cdot \bar{a} + s \cdot \bar{a}$
2. $r \cdot \overline{a+b} = r \cdot \bar{a} + r \cdot \bar{b}$

Definición 27 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, el subgrupo cíclico, generado por $\bar{a}$ es

$$\langle \bar{a} \rangle = \{k \cdot \bar{a} \in \mathbb{Z}_m \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Ejemplo 49 Determinar los subgrupos cíclicos de $(\mathbb{Z}_6, +)$

Solución: La tabla del grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$, esta dada en el ejemplo 47. Luego tenemos que:

$$\begin{aligned} \langle \bar{0} \rangle &= \{\bar{0}\} & \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{2} \rangle &= \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{0}\} & \langle \bar{3} \rangle &= \{\bar{3}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{4} \rangle &= \{\bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\} & \langle \bar{5} \rangle &= \{\bar{5}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{0}\} \end{aligned}$$

De lo anterior tenemos que existen 4 subgrupos cíclicos distintos y son:

$$\langle \bar{0} \rangle; \langle \bar{2} \rangle = \langle \bar{4} \rangle; \langle \bar{3} \rangle; \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{5} \rangle = \mathbb{Z}_6$$

Teorema 92 El grupo $\mathbb{Z}_n$ es cíclico.

Demostración: Existe $\bar{1} \in \mathbb{Z}_n$ y dado $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, se tiene que

$$\bar{a} = a \cdot \bar{1}$$

□

Definición 28 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, se dice que $k \in \mathbb{N}^*$ es el orden aditivo de $\bar{a}$ si y sólo si k es el menor entero positivo que $k \cdot \bar{a} = \bar{0}$. el número k se denota por $|\bar{a}|$

En el ejemplo anterior $\mathbb{Z}_6$, tenemos que:

$$|\bar{0}| = 1; |\bar{2}| = |\bar{4}| = 3; |\bar{3}| = 2; |\bar{1}| = |\bar{5}| = 6;$$

Teorema 93 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$,

$\bar{a}$ genera $\mathbb{Z}_n$ si y sólo si $(a, n) = 1$

Demostración: Supongamos que $\bar{a}$ genera $\mathbb{Z}_n$. Luego

$$(\exists k \in \mathbb{Z})(k \cdot \bar{a} = \bar{1})$$

es decir,

$$(\exists k \in \mathbb{Z})(ak - nq = 1)$$

por lo tanto a, n son primos relativos, $(a, n) = 1$.

En la otra dirección tenemos que $(a, n) = 1$, luego existe $x, y \in \mathbb{Z}$

$$ax + ny = 1$$

Ahora sea $\bar{b} \in \mathbb{Z}_n$, por lo tanto tenemos que

$$axb + nyb = 1b$$

es decir $(xb)a \equiv b \pmod{n}$, con lo cual $\bar{b} \in \langle \bar{a} \rangle$. □

Teorema 94 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, entonces

$$|\bar{a}| = \frac{n}{(a, n)}$$

Demostración: Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, luego tenemos que

$$\frac{n}{(a, n)} \bar{a} = \frac{\overline{na}}{(a, n)} = \frac{a}{(a, n)} \bar{n} = \bar{0}$$

Ahora veremos que es el menor.

$$|\bar{a}| \bar{a} = \bar{0} \Leftrightarrow |\bar{a}|a = nt, \exists t \in \mathbb{N}$$

luego tenemos que

$$|\bar{a}| \frac{a}{(a, n)} = \frac{n}{(a, n)} t,$$

de este modo tenemos que

$$\frac{n}{(a, n)} \mid |\bar{a}| \frac{a}{(a, n)}$$

pero $\left(\frac{n}{(a, n)}, \frac{a}{(a, n)} \right) = 1$, de lo cual obtenemos que

$$\frac{n}{(a, n)} \mid |\bar{a}|$$

por lo tanto

$$|\bar{a}| = \frac{n}{(a, n)} q, \exists q \in \mathbb{Z}$$

ambos son positivos y $|\bar{a}|$ es el más pequeño con la propiedad, luego

$$|\bar{a}| = \frac{n}{(a, n)}$$

□

Ejemplo 50

a) Determinar el orden de $\bar{8} \in \mathbb{Z}_{20}$

$$|\bar{8}| = \frac{20}{(8, 20)} = \frac{20}{4} = 5$$

b) Determinar el orden de $\bar{10} \in \mathbb{Z}_{15}$

$$|\bar{10}| = \frac{15}{(15, 10)} = \frac{15}{5} = 3$$

Corolario 95 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, entonces

$$|\bar{a}| \mid n$$

Teorema 96 Todo los subgrupos de $(\mathbb{Z}_n, +)$, son cíclicos.

Demostración: Sea H un subgrupo de $(\mathbb{Z}_n, +)$, no trivial.

Luego existe k el menor entero positivo, tal que $\bar{k} \in H$. Demostraremos que $H = \langle \bar{k} \rangle$

Sea $\bar{l} \in H$, aplicando algoritmo de la división obtenemos $l = kq + r$ donde $0 \leq r < k$, despejando obtenemos

$$\bar{r} = \overline{l - kq} = \bar{l} - q\bar{k} \in H$$

pero k era el menor entero positivo, luego $r = 0$, con lo cual tenemos

$$\bar{l} = q\bar{k} \in \langle \bar{k} \rangle$$

La otra contención es inmediata. □

Propiedad 97 Si $d \mid n$ entonces existe un único subgrupos de $(\mathbb{Z}_n, +)$, de orden d y todos los elementos de orden d pertenece al subgrupo cíclicos.

Demostración: Sea $d \mid n$, el orden de $\frac{\bar{n}}{d}$ en $\mathbb{Z}_n$ es d , ya que

$$\left| \frac{\bar{n}}{d} \right| = \frac{n}{(n, \frac{n}{d})} = \frac{n}{(d\frac{n}{d}, \frac{n}{d})} = d.$$

luego el subgrupo

$$\left\langle \frac{\bar{n}}{d} \right\rangle,$$

tiene orden d .

Sea $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$, de orden d , por lo tanto

$$d\bar{y} = \bar{0},$$

de otro modo $dy = nt$, es decir, $y = t\frac{n}{d}$, note que el elemento tiene orden d si $(d, t) = 1$

$$\bar{y} \in \left\langle \frac{\bar{n}}{d} \right\rangle.$$

□

Observación: Construir un reticulado de un grupo, es hacer un diagrama donde los vértices son lo subgrupos y la flecha indica contención, recuerde que la contención es una relación de orden parcial sobre los subconjunto.

Ejemplo 51 Construir el reticulado de los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{30}, +)$

Solución: Construimos los subgrupos de $\mathbb{Z}_{30}$. Para ello tenemos los primos relativos con 30, ellos nos entregan los generadores de $\mathbb{Z}_{30}$, el orden de $|\overline{2}| = 15$, luego todos los elementos del generado por $\overline{2}$ de orden 15 generan el mismo grupo. resumiendo tenemos los siguiente

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_{30} &= \langle \overline{1} \rangle = \langle \overline{7} \rangle = \langle \overline{11} \rangle = \langle \overline{13} \rangle = \langle \overline{17} \rangle = \langle \overline{19} \rangle = \langle \overline{23} \rangle = \langle \overline{29} \rangle \\ \langle \overline{0} \rangle &= \{ \overline{0} \} \\ \langle \overline{2} \rangle &= \{ \overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}, \overline{10}, \overline{12}, \overline{14}, \overline{16}, \overline{18}, \overline{20}, \overline{22}, \overline{24}, \overline{26}, \overline{28} \} \end{aligned}$$

De acuerdo a la propiedad 97, el exponente aditivo t , que ser primo relativo con el orden, luego $(t, 15) = 1$ para obtener otro generador debo amplificar por 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.

$$\begin{aligned} \langle \overline{2} \rangle &= \langle \overline{4} \rangle = \langle \overline{8} \rangle = \langle \overline{14} \rangle = \langle \overline{16} \rangle = \langle \overline{22} \rangle = \langle \overline{26} \rangle = \langle \overline{28} \rangle \\ \langle \overline{3} \rangle &= \{ \overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}, \overline{12}, \overline{15}, \overline{18}, \overline{21}, \overline{24}, \overline{27} \} \end{aligned}$$

El elemento tiene orden 10, luego los otros generadores, se obtiene determinando los t tales que $(t, 10) = 1$, es decir, 1, 3, 7, 9.

$$\begin{aligned} \langle \overline{3} \rangle &= \langle \overline{9} \rangle = \langle \overline{21} \rangle = \langle \overline{27} \rangle \\ \langle \overline{5} \rangle &= \{ \overline{0}, \overline{5}, \overline{10}, \overline{15}, \overline{20}, \overline{25} \} \\ \langle \overline{5} \rangle &= \langle \overline{25} \rangle \\ \langle \overline{6} \rangle &= \{ \overline{0}, \overline{6}, \overline{12}, \overline{18}, \overline{24} \} \\ \langle \overline{6} \rangle &= \langle \overline{12} \rangle = \langle \overline{18} \rangle = \langle \overline{24} \rangle \\ \langle \overline{10} \rangle &= \{ \overline{0}, \overline{10}, \overline{20} \} \\ \langle \overline{10} \rangle &= \langle \overline{20} \rangle \\ \langle \overline{15} \rangle &= \{ \overline{0}, \overline{15} \} \end{aligned}$$

Ahora construimos el reticulado:

Definición 29 Sea $n \in \mathbb{N}^*$. Se define la función de Euler, y esta dada por

$$\phi(n) = \#\{a \in \mathbb{N}^* \mid a \leq n \wedge (a, n) = 1\}$$

Ejemplo 52

- $\phi(1) = \#\{a \in \mathbb{N}^* \mid a \leq 1 \wedge (a, 1) = 1\} = \#\{1\} = 1$

$$2. \phi(7) = \#\{a \in \mathbb{N}^* \mid a \leq 7 \wedge (a, 7) = 1\} = \#\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = 6$$

$$3. \phi(8) = \#\{a \in \mathbb{N}^* \mid a \leq 8 \wedge (a, 8) = 1\} = \#\{1, 3, 5, 7\} = 4$$

$$4. \phi(10) = \#\{a \in \mathbb{N}^* \mid a \leq 10 \wedge (a, 10) = 1\} = \#\{1, 3, 7, 9\} = 4$$

Propiedad 98 Sea G un grupo cíclico con n elemento entonces el número de generadores de G es $\phi(n)$.

Propiedad 99 Sea $p \in \mathbb{N}$ un número primo entonces $\phi(p) = p - 1$

Demostración: Sea $a \in \mathbb{N}^*$, tal que $a < p$ y $(a, p) = d$, pero $d \neq p$, luego $d = 1$. □

Propiedad 100 Sean $p, n \in \mathbb{N}$, tal que p un número primo entonces $\phi(p^n) = p^{n-1}(p - 1)$

Demostración: Sea $a \in \mathbb{N}$, tal que $(a, p^n) = 1$, luego a no es múltiplo de p , es decir la cantidad de primos relativos a p^n es igual a la cantidad de números menores p^n , que no son múltiplo de p , por lo tanto

$$\phi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p - 1)$$

□

Ejemplo 53

$$\phi(8) = \phi(2^3) = 2^2(2 - 1) = 4$$

$$\phi(16) = \phi(2^4) = 2^3(2 - 1) = 8$$

Propiedad 101 Sean $a, b \in \mathbb{N}$, tales que $(a, b) = 1$ entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$

Demostración: Consideremos

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z}_{ab} &\rightarrow \mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b \\ \bar{x} &\rightarrow (\bar{x}, \bar{x}) \end{aligned}$$

Es una función ya que, dado $\bar{x} = \bar{y} \in \mathbb{Z}_{ab}$, luego $ab \mid (x - y)$, es decir $a \mid (x - y) \wedge b \mid (x - y)$, por lo tanto

$$(\bar{x}, \bar{x}) = (\bar{y}, \bar{y}) \in \mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$$

Además es biyectiva, ya que, si $f(\bar{x}) = f(\bar{y})$ entonces $x \equiv y \pmod{a}$, $x \equiv y \pmod{b}$, de lo cual

$$at = x - y = bl$$

De lo cual, $l = at'$. es decir $x - y = abt'$. Por lo tanto $x \equiv y \pmod{ab}$.

La epiyectiva, sean $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ tales que $ax_0 + by_0 = 1$. Sea $(\bar{u}, \bar{v}) \in \mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$, luego definimos $x = u - ax_0(u - v) = v + by_0(u - v)$, de lo cual se obtiene que

$$x \equiv u \pmod{a} \wedge x \equiv v \pmod{b}$$

De este modo la función es biyectiva.

Además $f(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x}) + f(\bar{y})$, con lo cual envía generador en generador.

Al considerar un generador de $\mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$, sus coordenadas deben generar a cada componente. Por otro lado, dado generadores $\bar{x}, \bar{y}$ de $\mathbb{Z}_a, \mathbb{Z}_b$, se tiene,

$$k(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{0}, \bar{0}) \in \mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$$

De lo cual se tiene que, $kx \equiv 0 \pmod{a}$ y $ky \equiv 0 \pmod{b}$ como $(x, a) = 1 = (y, b)$, luego $k = at = bl$, es decir, $ab|k$, luego $(\bar{x}, \bar{y})$ generan.

De este modo, todo generador de $\mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$, le corresponde un generador de $\mathbb{Z}_{ab}$, y se construye con generadores de $\mathbb{Z}_a, \mathbb{Z}_b$ respectivamente. $\square$

Ejemplo 54 Calcular $\phi(100)$

$$\phi(100) = \phi(2^2 5^2) = \phi(2^2)\phi(5^2) = 2 \cdot 5(5 - 1) = 10$$

Teorema 102 Sea $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{d|n, d>0} \phi(d) = n$$

Demostración: En $\mathbb{Z}_n$ se define la siguiente relación

$$\bar{a} \sim \bar{b} \Leftrightarrow |\bar{a}| = |\bar{b}|$$

Es Refleja: $|\bar{a}| = |\bar{a}| \Leftrightarrow \bar{a} \sim \bar{a}$

Es Simétrica: $\bar{a} \sim \bar{b} \Leftrightarrow |\bar{a}| = |\bar{b}| \Leftrightarrow |\bar{b}| = |\bar{a}| \Leftrightarrow \bar{b} \sim \bar{a}$

Es Transitiva: $\bar{a} \sim \bar{b} \wedge \bar{b} \sim \bar{c}$, luego $|\bar{a}| = |\bar{b}| \wedge |\bar{b}| = |\bar{c}|$, de lo cual $|\bar{a}| = |\bar{c}|$.

Por lo tanto

$$\bar{a} \sim \bar{c}$$

De este modo $\sim$ es una relación de equivalencia, denotemos la clase de equivalencia para $d|n$

$$C_d = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid |\bar{a}| = d\}$$

De este modo se obtiene $\mathbb{Z}_n = \dot{\cup}_{d|n, d>0} C_d$, es decir $n = \sum_{d|n, d>0} |C_d|$. Por la propiedad 97 tenemos que existe un único subgrupo de orden un divisor y todos los elementos de ese orden están en el subgrupo. Luego, debemos tener presente que el grupo cíclico $\langle \frac{n}{d} \rangle$ de orden d , tiene $\phi(d)$ generadores, luego en $\mathbb{Z}_n$ existe $\phi(d)$ elementos de orden d , así tenemos $\phi(d) = |C_d|$, reemplazando obtenemos

$$n = \sum_{d|n, d>0} |C_d| = \sum_{d|n, d>0} \phi(d)$$

$\square$

3.3. Producto en $\mathbb{Z}_m$

Teorema 103 Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}, m > 0$. cualesquiera, si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

Demostración: Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces existen enteros r, k tales que

$$a = b + km \quad \text{y} \quad c = d + rm,$$

luego

$$ac = (b + km)(d + rm) = bd + (br + kd + kr)m.$$

Ahora bien, definiendo $t = br + kd + kr \in \mathbb{Z}$, tenemos que

$$ac = bd + tm \Leftrightarrow ac \equiv bd \pmod{m}.$$

□

Observación: El teorema anterior nos permite definir el producto en $\mathbb{Z}_m$ como sigue:

Definición 30 Sean $\bar{a}$ y $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, se definen producto por

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}.$$

Teorema 104 $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo

Ejemplo 55 Construir la tabla de $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$.

Solución: Con las misma notación empleada en la suma, construimos la siguiente tabla:

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$						
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Definición 31 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, se dice que $\bar{a}$ es invertible si y sólo si existe $\bar{b} \in \mathbb{Z}_n$, tal que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$

En el ejemplo anterior tenemos que los elemento invertible son $\bar{1}, \bar{5}$

Teorema 105 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$,

$$\bar{a} \text{ es invertible si y sólo si } (a, n) = 1$$

Corolario 106 Si $p \in \mathbb{Z}$ es un número primo entonces todo elemento no nulo de $\mathbb{Z}_p$ es invertible. De otro modo $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Corolario 107 Si p número primo, entonces el anillo $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ no tiene divisores de cero, es decir,

$$\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow (\bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0}), \text{ para todo } \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}$$

Propiedad 108 Si n no primo entonces $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ tiene divisores de cero

Demostración: Si n es un número compuesto, entonces $n = ab$, con $0 < a < n$, $0 < b < n$, luego $\bar{a} \neq 0, \bar{b} \neq 0$ en $\mathbb{Z}_n$. Y se cumple que

$$\bar{a}\bar{b} = \bar{n} = \bar{0}$$

□

Notación: El conjunto de elementos invertibles en $\mathbb{Z}_n$ se denota por

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \{ \bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \bar{a} \text{ es invertible} \}$$

El inverso multiplicativo de $\bar{a}$ se denota por $\bar{a}^{-1}$

Observación: La cantidad de elementos invertible en $\mathbb{Z}_n$ es $\phi(n) = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)|$

Teorema 109 $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ es un grupo abeliano, y es llamado el grupo de las unidades de $\mathbb{Z}_n$

Ejemplo 56 Construir la tabla de $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_7), \cdot)$ y $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8), \cdot)$

Solución:

$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_7)$

$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8)$

·	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{1}$	1	2	3	4	5	6
$\bar{2}$	2	4	6	1	3	5
$\bar{3}$	3	6	2	5	1	4
$\bar{4}$	4	1	5	2	6	3
$\bar{5}$	5	3	1	6	4	2
$\bar{6}$	6	5	4	3	2	1

·	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$
$\bar{1}$	1	3	5	7
$\bar{3}$	3	1	7	5
$\bar{5}$	5	7	1	3
$\bar{7}$	7	5	3	1

El grupo $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_7), \cdot)$ es cíclico

El grupo $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8), \cdot)$ no es cíclico

Definición 32 Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n - \{\bar{0}\}$, y $m \in \mathbb{N}$, entonces se define por recurrencia la potencia multiplicativa m -ésima de $\bar{a}$

$$\begin{aligned} \bar{a}^0 &= \bar{1} \\ \bar{a}^{m+1} &= \bar{a}^m \cdot \bar{a} \end{aligned}$$

Además $\bar{a} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$, entonces

$$\begin{aligned} \bar{0}^m &= \bar{0}, \quad m \neq 0 \\ (\bar{a})^{-m} &= (\bar{a}^{-1})^m \end{aligned}$$

Definición 33 Sea $\bar{a} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$, se dice que $k \in \mathbb{N}^*$ es el orden multiplicativo de $\bar{a}$ si y sólo si k es el menor entero positivo que $\bar{a}^k = \bar{1}$.

Notación: $k = |\bar{a}|$, cuidado con la notación, ya que es la misma, lo que varía es el grupo, es decir, el conjunto con la operación binaria.

Observación: En el ejemplo 56, tenemos la tabla del grupo $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_7)$ y podemos obtener los ordenes multiplicativos de cada elemento

$$|\bar{1}| = 1, \quad |\bar{2}| = 3, \quad |\bar{3}| = 6, \quad |\bar{4}| = 3, \quad |\bar{5}| = 2.$$

Teorema 110 El grupo $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ es cíclico si y sólo si existe p número primo impar y $m \in \mathbb{N}^*$ tal que

$$n = p^m, \vee n = 2p^m, \vee n = 2, \vee n = 4$$

Ejemplo 57

1. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$ es cíclico, ya que $18 = 2 \cdot 3^2$
2. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{20})$ no es cíclico, ya que $20 = 2^2 \cdot 5$
3. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{30})$ no es cíclico, ya que $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$
4. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{50})$ es cíclico, ya que $50 = 2 \cdot 5^2$

Definición 34 Sean $a \in \mathbb{Z}^*$, $b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Una ecuación con congruencia de grado 1 es de la forma

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

donde a, b son los coeficiente y x la incognita

Ejemplo 58 Resolver en $\mathbb{Z}$, la ecuación

$$2x \equiv 3 \pmod{13}$$

Solución: Resolver la ecuación es equivalente a resolver

$$2x = 3 + 13t \quad \text{o bien} \quad 2x - 13t = 3$$

Como sabemos que

$$2(7) - 13(1) = 1$$

luego son primos relativos, y una solución particular es

$$x_0 = 21 \wedge t_0 = 3$$

Por lo tanto, la solución general es

$$x = 21 + 13s \wedge t = 3 + 2s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Con lo cual, la solución de la ecuación $2x \equiv 3 \pmod{13}$ es

$$S = \{21 + 13s \mid s \in \mathbb{Z}\}$$

Observación: La ecuación en $\mathbb{Z}_{13}$ tiene única solución y es $\bar{8}$

Teorema 111 *La congruencia $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución en $\mathbb{Z}$ si y sólo si $(a, n) | b$*

Demostración: Supongamos que congruencia $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución en $\mathbb{Z}$, luego existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\begin{aligned} ac &\equiv b \pmod{n} \\ ac - nt &= b \end{aligned}$$

Por lo tanto la ecuación diofántica $ax + ny = b$ tiene solución, luego $(a, n) | b$.

En el otro sentido, suponemos que $(a, n) | b$, luego la ecuación diofántica $ax + ny = b$ tiene solución, sea x_0, y_0 una solución, por lo tanto

$$\begin{aligned} ax_0 + ny_0 &= b \\ ax_0 &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

□

Observación: recuerde que las soluciones esta dada por

$$x = x_0 + \frac{n}{(a, n)}t$$

es decir, en general la solución no es única en $\mathbb{Z}_n$

Ejemplo 59 *Resolver en $\mathbb{Z}$, la ecuación*

$$2x \equiv 6 \pmod{8}$$

Solución: Resolver la ecuación es equivalente a resolver

$$2x = 6 + 8t \quad \text{o bien} \quad x - 4t = 3$$

Como sabemos que

$$1(3) - 4(0) = 3$$

luego una solución particular es

$$x_0 = 3 \wedge t_0 = 0$$

Por lo tanto, la solución general esta dada por

$$x = 3 + 4s \wedge t = 0 + s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Con lo cual, la solución de la ecuación $2x \equiv 6 \pmod{8}$ es

$$S = \{3 + 4s \mid s \in \mathbb{Z}\}$$

Observación: La ecuación en $\mathbb{Z}_8$ tiene dos solución y son $\overline{3}, \overline{7}$

Propiedad 112 *Sean $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$ y el sistema de ecuaciones lineales*

$$\begin{array}{l} a_1x + b_1y \equiv c_1(\text{mod } m) \\ a_2x + b_2y \equiv c_2(\text{mod } m) \end{array} \Bigg|$$

si $(a_1b_2 - a_2b_1, m) = 1$ entonces tiene solución el sistema.

Demostración: Dado el sistema

$$\begin{array}{l} a_1x + b_1y \equiv c_1(\text{mod } m) \\ a_2x + b_2y \equiv c_2(\text{mod } m) \end{array} \Bigg|$$

Amplificando las ecuaciones

$$\begin{array}{l} a_1x + b_1y \equiv c_1(\text{mod } m) \quad / \cdot a_2 \\ a_2x + b_2y \equiv c_2(\text{mod } m) \quad / \cdot -a_1 \end{array} \Bigg|$$

Sumando obtenemos

$$(a_2b_1 - a_1b_2)y = a_2c_1 - a_1c_2(\text{mod } m)$$

Por el teorema anterior se obtiene el resto de la demostración □

Ejemplo 60 Resolver:

$$\begin{array}{l} 2x + y \equiv 3(\text{mod } 13) \\ 3x + 5y \equiv 1(\text{mod } 13) \end{array} \Bigg|$$

Solución:

$$\begin{array}{l} 2x + y \equiv 3(\text{mod } 13) \quad / \cdot -5 \\ 3x + 5y \equiv 1(\text{mod } 13) \end{array} \Bigg|$$

$$\begin{array}{l} -10x - 5y \equiv -15(\text{mod } 13) \\ 3x + 5y \equiv 1(\text{mod } 13) \end{array} \Bigg|$$

Sumando obtenemos

$$\begin{array}{l} -7x \equiv -14(\text{mod } 13) \quad / \cdot -7^{-1} \\ x \equiv -14(-7)^{-1}(\text{mod } 13) \\ x \equiv 2(\text{mod } 13) \end{array}$$

Reemplazando obtenemos

$$\begin{array}{l} y \equiv 3 - 2x(\text{mod } 13) \\ y \equiv 3 - 2 \cdot 2(\text{mod } 13) \\ y \equiv -1(\text{mod } 13) \quad -1 + 13 = 12 \\ y \equiv 12(\text{mod } 13) \end{array}$$

Luego, el conjunto solución del sistema es

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x \equiv 2(\text{mod } 13) \wedge y \equiv 12(\text{mod } 13)\}$$

Ejemplo 61 Dada el par de congruencia

$$x \equiv 1(\text{mod } 4) \wedge x \equiv 2(\text{mod } 3)$$

Construir una sola congruencia equivalente a las anteriores

Solución: La solución de las congruencia es:

$$S = \{x \in \mathbb{Z} \mid (\exists k_1 \in \mathbb{Z})(x = 4k_1 + 1)\} \cap \{x \in \mathbb{Z} \mid (\exists k_2 \in \mathbb{Z})(x = 3k_2 + 2)\}$$

Luego tenemos que dado $x \in S$ se tiene que

$$\begin{aligned} x &= 4k_1 + 1 \wedge x = 3k_2 + 2 \\ 4k_1 + 1 &= 3k_2 + 2 \\ 4k_1 - 3k_2 &= 1 \end{aligned}$$

Una solución particular de la ecuación diofántica es $k_1 = 1, k_2 = 1$ La solución general es

$$k_1 = 1 + 3t, k_2 = 1 + 4t$$

reemplazando obtenemos

$$\begin{aligned} x &= 4k_1 + 1 \wedge x = 3k_2 + 2 \\ x &= 4(1 + 3t) + 1 \wedge x = 3(1 + 4t) + 2 \\ x &= 5 + 12t \wedge x = 5 + 12t \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$x \equiv 5(\text{mod } 12)$$

Teorema 113 (Chino del Resto) Si $(m_i, m_j) = 1$, para $i \neq j$, entonces el sistema de congruencias

$$\left. \begin{aligned} x &\equiv a_1(\text{mod } m_1) \\ x &\equiv a_2(\text{mod } m_2) \\ &\vdots \\ x &\equiv a_k(\text{mod } m_k) \end{aligned} \right\}$$

tiene solución. Y dos soluciones del sistema son congruentes $(\text{mod } m_1 \cdot m_2 \cdots m_k)$.

Demostración: Sea $m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdots m_k$, luego tenemos que $(\frac{m}{m_j}, m_j) = 1$. Por lo tanto,

$$(\exists b_j \in \mathbb{Z})(\frac{m}{m_j} b_j \equiv 1(\text{mod } m_j))$$

Notemos que

$$\frac{m}{m_j} b_j a_j \equiv a_j(\text{mod } m_j) \wedge \frac{m}{m_j} b_j a_j \equiv 0(\text{mod } m_i) \text{ con } i \neq j$$

Definimos

$$x_0 = \sum_{i=1}^k \frac{m}{m_i} b_i a_i$$

Luego se tiene que x_0 es solución particular del sistema de congruencias.

Además sean x_1 y x_2 dos soluciones del sistema de congruencias, luego se tiene que

$$x_1 \equiv a_i \pmod{m_i} \quad x_2 \equiv a_i \pmod{m_i}$$

es decir

$$x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{m_i}$$

Con lo cual obtenemos

$$x_1 - x_2 = m_1 t_1 = m_2 t_2 = \dots = m_k t_k$$

Así se obtiene $m_2 | m_1 t_1$ y como $(m_1, m_2) = 1$ entonces $m_2 | t_1$,

$$x_1 - x_2 = m_1 m_2 t'_1 = m_3 t_3 = \dots = m_k t_k$$

Repitiendo el proceso tenemos que $m_3 | m_1 m_2 t'_1$ y como $(m_3, m_1) = (m_3, m_2) = 1$ entonces $m_3 | t'_1$, continuando de la misma manera se obtiene en forma recursiva que

$$x_1 - x_2 = m_1 m_2 m_3 \dots m_k t'_k \equiv 0 \pmod{m_1 m_2 m_3 \dots m_k}$$

□

Ejemplo 62 Resolver:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{array} \right\}$$

Solución: Notemos que $(3, 5) = 1$, $(5, 7) = 1$, $(3, 7) = 1$ y $m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 = 105$

$$\begin{array}{lll} \frac{m}{m_1} \cdot b_1 \equiv 1 \pmod{m_1} & \frac{m}{m_2} \cdot b_2 \equiv 1 \pmod{m_2} & \frac{m}{m_3} \cdot b_3 \equiv 1 \pmod{m_3} \\ 35 \cdot b_1 \equiv 1 \pmod{3} & 21 \cdot b_2 \equiv 1 \pmod{5} & 15 \cdot b_3 \equiv 1 \pmod{7} \\ b_1 \equiv 2 \pmod{3} & b_2 \equiv 1 \pmod{5} & b_3 \equiv 1 \pmod{7} \end{array}$$

Luego la solución particular es:

$$\begin{aligned} x_0 &= a_1 \cdot b_1 \cdot \frac{m}{m_1} + a_2 \cdot b_2 \cdot \frac{m}{m_2} + a_3 \cdot b_3 \cdot \frac{m}{m_3} \\ x_0 &= 2 \cdot 2 \cdot 35 + 3 \cdot 1 \cdot 21 + 2 \cdot 1 \cdot 15 \\ x_0 &= 233 \end{aligned}$$

La solución general esta dada por

$$\begin{array}{l} x \equiv x_0 \pmod{m} \\ x \equiv 233 \pmod{105} \\ x \equiv 23 \pmod{105} \end{array}$$

Otra forma de resolver es: En la primera obtenemos que $x = 2 + 3t$ con $t \in \mathbb{Z}$, reemplazando en la segunda se tiene que

$$\begin{aligned}x &\equiv 3 \pmod{5} \\2 + 3t &\equiv 3 \pmod{5} \\3t &\equiv 1 \pmod{5} \\t &\equiv 2 \pmod{5}\end{aligned}$$

de lo cual obtenemos que $t = 2 + 5r$, reemplazando obtenemos

$$x = 2 + 3t = 2 + 3(2 + 5r) = 8 + 15r$$

Ahora reemplazamos en la tercera congruencia

$$\begin{aligned}x &\equiv 2 \pmod{7} \\8 + 15r &\equiv 2 \pmod{7} \\r &\equiv -6 \pmod{7} \\r &\equiv 1 \pmod{7}\end{aligned}$$

De este modo tenemos que $r = 1 + 7l$ reemplazando tenemos

$$x = 8 + 15r = 8 + 15(1 + 7l) = 23 + 105l$$

luego

$$x \equiv 23 \pmod{105}$$

De este modo se tiene que el conjunto solución es

$$S = \{23 + 105t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

3.4. Teorema Euler y Fermat

Definición 35 Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $S = \{r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}\} \subseteq \mathbb{Z}$, se dice que S es un sistema **reducido** módulo n si y sólo si $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_{\phi(n)}\}$

Observación: Tenga presente que $(n, r_i) = 1$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, \phi(n)\}$.

Teorema 114 Sean $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, n) = 1$ y $\{r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}\}$ un sistema reducido módulo n , entonces $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\phi(n)}\}$ otro sistema reducido módulo n

Demostración: Como $(a, n) = 1$ y $(r_i, n) = 1$, entonces para todo i se tiene que $(ar_i, n) = 1$.

Ahora veremos que las clases son distintas, para ello notemos que

$$ar_i \equiv ar_j \pmod{n} \Leftrightarrow r_i \equiv r_j \pmod{n}$$

Luego si $i \neq j \Rightarrow r_i \not\equiv r_j \pmod{n}$

□

Teorema 115 Sean $p \in \mathbb{Z}^+$, primo y $\{r_1, r_2, \dots, r_{\phi(p)}\}$ un sistema reducido módulo p , entonces

$$r_1 r_2 \cdots r_{\phi(p)} \equiv -1 \pmod{p}$$

Demostración: Supongamos que $p \neq 2$, luego $1 \not\equiv -1 \pmod{p}$, ahora reordenemos el producto

$$r_1 r_2 \cdots r_{\phi(p)} \equiv (1)(-1)r'_1(r'_1)^{-1} \cdots r'_l(r'_l)^{-1} \equiv -1 \pmod{p}$$

□

Observación: La demostración anterior se puede extender para el caso que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ es cíclico.

Corolario 116 (Teorema de Wilson) Sean $p \in \mathbb{Z}^+$, primo

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Teorema 117 (Euler) Sean $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, n) = 1$ entonces

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Demostración: Sea $\{r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}\}$ un sistema reducido módulo n , como $(a, n) = 1$ entonces $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\phi(n)}\}$ un sistema reducido módulo n . luego tenemos

$$\begin{aligned} r_1 r_2 \cdots r_{\phi(n)} &\equiv (ar_1)(ar_2) \cdots (ar_{\phi(n)}) \pmod{n} \\ r_1 r_2 \cdots r_{\phi(n)} &\equiv (a)^{\phi(n)} r_1 r_2 \cdots r_{\phi(n)} \pmod{n} \\ 1 &\equiv (a)^{\phi(n)} \pmod{n} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 63 Determinar el resto al dividir 7^{1000} por 48

Solución: Como $(7, 48) = 1 \Rightarrow 7^{\phi(48)} \equiv 1 \pmod{48}$

$$\phi(48) = \phi(2^4 \cdot 3) = \phi(2^4) \phi(3) = (2^4 - 2^3) \cdot (3 - 1) = 2^3 (2 - 1) 2 = 2^4 = 16.$$

Luego tenemos que $7^{16} \equiv 1 \pmod{48}$.

Aplicamos el algoritmo de la división, obtenemos que $1000 = 16 \cdot 62 + 8$

$$\begin{aligned} 7^{1000} &\equiv 7^{16 \cdot 62 + 8} \pmod{48} \\ 7^{1000} &\equiv (7^{16})^{62} \cdot 7^8 \pmod{48} \\ 7^{1000} &\equiv 1^{62} (7^2)^4 \pmod{48} \\ 7^{1000} &\equiv 1 \cdot (49)^4 \pmod{48}, \text{ ya que } 49 \equiv 1 \pmod{48} \\ 7^{1000} &\equiv 1^4 \pmod{48} \\ 7^{1000} &\equiv 1 \pmod{48} \end{aligned}$$

Por lo tanto el resto al dividir 7^{1000} por 48 es 1

Teorema 118 (Fermat) Sean $p \in \mathbb{Z}^+$ un número primo, $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, p) = 1$ entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Ejemplo 64 Resolver la ecuación

$$3x^{14} + 4x^{13} + 3x^{12} + 2x^{11} + x^9 + 2x^8 + 4x^7 + x^6 + 3x^4 + x^3 + 4x^2 + 2x \equiv 0 \pmod{5}$$

Solución: Al factorizar la expresión, tenemos

$$x(3x^{13} + 4x^{12} + 3x^{11} + 2x^{10} + x^8 + 2x^7 + 4x^6 + x^5 + 3x^3 + x^2 + 4x + 2) \equiv 0 \pmod{5}$$

note que 5 es un número primo, luego no tiene divisores de cero, de esta manera se tiene

$$x \equiv 0 \quad \vee \quad 3x^{13} + 4x^{12} + 3x^{11} + 2x^{10} + x^8 + 2x^7 + 4x^6 + x^5 + 3x^3 + x^2 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$$

Para las raíces no nulas, aplicamos el teorema Fermat, es decir $x^4 \equiv 1 \pmod{5}$, con $x \not\equiv 0 \pmod{5}$, luego tenemos $x^{4q+r} \equiv x^r \pmod{5}$

$$13 \equiv 1; 12 \equiv 0; 11 \equiv 3; 10 \equiv 2; 8 \equiv 0; 7 \equiv 3; 6 \equiv 2; 5 \equiv 1; 8 \equiv 0; \pmod{4}$$

$$3x^{13} + 4x^{12} + 3x^{11} + 2x^{10} + x^8 + 2x^7 + 4x^6 + x^5 + 3x^3 + x^2 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$3x^1 + 4x^0 + 3x^3 + 2x^2 + x^0 + 2x^3 + 4x^2 + x^1 + 3x^3 + x^2 + 4x^1 + 2 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$(3 + 2 + 3)x^3 + (2 + 4 + 1)x^2 + (3 + 1 + 4)x + (4 + 1 + 2) \equiv 0 \pmod{5}$$

$$3x^3 + 2x^2 + 3x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$3x(x^2 + 1) + 2(x^2 + 1) \equiv 0 \pmod{5}$$

$$(3x + 2)(x^2 + 1) \equiv 0 \pmod{5}$$

Luego tenemos que

$$3x + 2 \equiv 0 \pmod{5} \quad \vee \quad (x^2 + 1) \equiv 0 \pmod{5}$$

La primera ecuación obtenemos que

$$(3x + 2) \equiv 0 \pmod{5} \Leftrightarrow 3x \equiv -2 \pmod{5} \Leftrightarrow x \equiv -4 \equiv 1 \pmod{5}$$

La segunda ecuación

$$x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{5} \Leftrightarrow x^2 - 4 \equiv 0 \pmod{5} \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) \equiv 0 \pmod{5}$$

de lo cual obtenemos

$$x \equiv 2 \pmod{5} \quad \vee \quad x \equiv -2 \equiv 3 \pmod{5}$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$S = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$$

3.5. Congruencia de grado 2

Solamente resolveremos ecuaciones de segundo grado en $\mathbb{Z}_p$, con p primo impar, ya que en este caso $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$, tal que $(a, p) = 1$, entonces debemos estudiar el conjunto solución de la ecuación

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

La solución en general podemos obtenerla de

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &\equiv 0 \pmod{p} / 4a \\ 4a^2x^2 + 4abx + 4ac &\equiv 0 \pmod{p} \\ (2ax)^2 + 2(2ax)b + 4ac &\equiv 0 \pmod{p} / + b^2 \\ (2ax)^2 + 2(2ax)b + b^2 + 4ac &\equiv b^2 \pmod{p} / - 4ac \\ (2ax + b)^2 &\equiv b^2 - 4ac \pmod{p} \end{aligned}$$

Definición 36 Sea $\Delta = b^2 - 4ac$, se llama el discriminante de la ecuación

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

Observación: Realizando un cambio de variable $z = 2ax + b$ la ecuación cuadrática se traduce en

$$z^2 \equiv \Delta \pmod{p}$$

Definición 37 Sea $a \in \mathbb{Z}^*$ tal que $(a, p) = 1$.

Se dice que a es un **residuo cuadrático** o un cuadrado módulo p si y sólo si $x^2 \equiv a \pmod{p}$ tiene solución, de otro modo si existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $b^2 \equiv a \pmod{p}$.

En caso contrario, se dice que a no es un residuo cuadrático o que no es un cuadrado módulo p .

Notación: Se denota el conjunto de los cuadrado módulo p

$$\square_p = \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)\}.$$

Ejemplo 65 Determinar el conjunto $\square_5 = \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_5)\}$ y $\not\square_5 = \mathcal{U}(\mathbb{Z}_5) - \square_5$

Solución: Calculemos el cuadrado de cada elemento

$$\bar{1}^2 = 1 \pmod{5} \quad \bar{2}^2 = 4 \pmod{5} \quad \bar{3}^2 = 4 \pmod{5} \quad \bar{4}^2 = 1 \pmod{5}$$

Luego tenemos

$$\square_5 = \{\bar{1}, \bar{4}\} \quad \not\square_5 = \{\bar{2}, \bar{3}\}$$

Ejemplo 66 Resolver las ecuaciones

$$x^2 \equiv 2 \pmod{7} \quad x^2 \equiv 3 \pmod{7}$$

Solución: Al calcular el cuadrado de cada elemento obtenemos que

$$\begin{aligned}\square_7 &= \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_7)\} \\ &= \{\bar{1}^2, \bar{2}^2, \bar{3}^2, \bar{4}^2, \bar{5}^2, \bar{6}^2\} \\ &= \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{1}\} \\ &= \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{2}\}.\end{aligned}$$

Luego la ecuación $x^2 \equiv 2 \pmod{7}$, tiene dos soluciones en $\mathbb{Z}_7$ y son $\bar{3}, \bar{4}$. El conjunto solución de la otra ecuación $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$, es vacío.

Teorema 119 *La congruencia $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ tiene solución no vacía si y sólo si $\bar{\Delta} \in \square_p \cup \{0\}$*

Teorema 120 *El conjunto $\square_p$ es un subgrupo de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)$.*

Demostración: i) *Clausura:* Sean $\bar{x}^2, \bar{y}^2 \in \square_p$, entonces tenemos

$$\bar{x}^2 \cdot \bar{y}^2 = (\bar{x} \cdot \bar{y})^2 \in \square_p$$

ii) *Neutro:*

$$\bar{1} = \bar{1}^2 \in \square_p$$

iii) *Inverso:*

$$(\bar{x}^2)^{-1} = (\bar{x}^{-1})^2 \in \square_p$$

Por lo tanto se tiene que $\square_p$ es un subgrupo de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)$. □

Teorema 121 *Sea $p \in \mathbb{Z}$, un número primo impar entonces*

$$|\square_p| = \frac{p-1}{2}$$

Demostración: Sean $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)$ se define la siguiente relación

$$\bar{a} \sim \bar{b} \Leftrightarrow \bar{a}^2 = \bar{b}^2$$

Veremos que $\sim$ es una relación de equivalencia

Es *Refleja*: $\bar{a}^2 = \bar{a}^2 \Leftrightarrow \bar{a} \sim \bar{a}$

Es *Simétrica*: $\bar{a} \sim \bar{b} \Leftrightarrow \bar{a}^2 = \bar{b}^2 \Leftrightarrow \bar{b}^2 = \bar{a}^2 \Leftrightarrow \bar{b} \sim \bar{a}$

Es *Transitiva*: Si $\bar{a} \sim \bar{b} \wedge \bar{b} \sim \bar{c}$, entonces $\bar{a}^2 = \bar{b}^2 \wedge \bar{b}^2 = \bar{c}^2$, de lo cual se obtiene $\bar{a}^2 = \bar{c}^2$, es decir, $\bar{a} \sim \bar{c}$.

Luego $\sim$ es una relación de equivalencia, ahora nos interesa determinar la cardinalidad de cada clase

$$\bar{a} \sim \bar{b} \Leftrightarrow \bar{a}^2 = \bar{b}^2 \Leftrightarrow \bar{a}^2 - \bar{b}^2 = \bar{0} \Leftrightarrow (\bar{a} - \bar{b})(\bar{a} + \bar{b}) = \bar{0} \Leftrightarrow (\bar{b} = \bar{a} \vee \bar{b} = -\bar{a})$$

Luego la clase de $\bar{a}$, denotada por

$$[\bar{a}] = \{\bar{a}, -\bar{a}\},$$

contiene dos elemento siempre, ya que p es un primo impar.

Ahora bien, sea r el número de clases de equivalencia, por lo tanto $2r = p - 1$, es decir, $r = \frac{p-1}{2}$.

De lo cual obtenemos que

$$\begin{aligned} f : \mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)/\sim &\rightarrow \square_p \\ [\bar{a}] &\rightarrow \bar{a}^2 \end{aligned}$$

es una función biyectiva, luego $|\square_p| = \frac{p-1}{2}$ □

Teorema 122 *Sea p un número primo impar y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, p) = 1$ entonces*

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \quad \vee \quad a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

Demostración: Por Teorema de Fermat, tenemos que

$$\begin{aligned} a^{p-1} &\equiv 1 \pmod{p} \\ (a^{\frac{p-1}{2}})^2 &\equiv 1 \pmod{p} \\ (a^{\frac{p-1}{2}})^2 - 1 &\equiv 0 \pmod{p} \\ (a^{\frac{p-1}{2}} - 1)(a^{\frac{p-1}{2}} + 1) &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \quad \vee \quad a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

□

Teorema 123 *Sea p un número primo impar y $a \in \mathbb{Z}$ entonces*

$$\bar{a} \in \square_p \quad \Leftrightarrow \quad a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

Demostración: Sea $\bar{a} \in \square_p$ entonces existe $b \in \mathbb{Z}$, tal que $\bar{a} = \bar{b}^2$ de lo cual obtenemos

$$\begin{aligned} a^{\frac{p-1}{2}} &\equiv (b^2)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \\ &\equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \end{aligned}$$

En la otra dirección, sabemos $\mathbb{Z}_p$ es cuerpo y $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)$, es cíclico, luego todo los elemento de $\square_p$ son $\frac{p-1}{2}$ y son raíces del polinomio $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ y este polinomio tiene a lo más $\frac{p-1}{2}$, luego son las únicas las que pertenecen a $\square_p$ □

Propiedad 124 *Sean p un número primo impar y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}_p) - \square_p$ entonces*

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

Definición 38 (Símbolo de Legendre) Sea p un número primo impar y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, p) = 1$.

Se define

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{a} \in \square_p \\ -1 & \text{si } \bar{a} \notin \square_p \end{cases}$$

Ejemplo 67 En el ejemplo 66 tenemos que

$$\square_7 = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\} \quad \not\square_7 = \{\bar{3}, \bar{5}, \bar{6}\}$$

De lo anterior tenemos que

$$\left(\frac{1}{7}\right) = 1; \left(\frac{2}{7}\right) = 1; \left(\frac{4}{7}\right) = 1; \left(\frac{3}{7}\right) = -1; \left(\frac{5}{7}\right) = -1; \left(\frac{6}{7}\right) = -1$$

Propiedad 125 Sean p un número primo impar y $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a, p) = (b, p) = 1$.

1. $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$
2. $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$
3. $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$
4. Si $a \equiv b \pmod{p}$ entonces $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$

Demostración: La demostración de (1), se obtiene por el teorema 122, (2) es inmediata, la demostración de (3) por caso:

- Si $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ y $b^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ luego tenemos

$$1 \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Luego se cumple

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

- Si $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ y $b^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ luego tenemos

$$-1 \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Luego se cumple

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

- Si $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ y $b^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ luego tenemos

$$1 \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Luego se cumple

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

Ejemplo 68 *Calcular*

$$\left(\frac{1785}{13}\right)$$

Solución: Usando el algoritmo de la división tenemos $1785 = 13 \cdot 137 + 4$, luego

$$\left(\frac{1785}{13}\right) = \left(\frac{4}{13}\right) = \left(\frac{2^2}{13}\right) = 1$$

Propiedad 126 *Sea p un número primo impar entonces*

1. $p \equiv 1 \pmod{4} \Leftrightarrow \overline{-1} \in \square_p$
2. $p \equiv 3 \pmod{4} \Leftrightarrow \overline{-1} \in \not\subseteq_p$

Demostración: Sea $p \equiv 1 \pmod{4}$, luego tenemos $\frac{p-1}{4} \in \mathbb{Z}$.

Por la propiedad 124 tenemos $-1 \equiv ((a)^{\frac{p-1}{2}}) \equiv ((a)^{\frac{p-1}{4}})^2$, luego $\overline{-1} \in \square_p$.

En el otro sentido tenemos $\overline{-1} \in \square_p$, por lo tanto $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$, luego $\frac{p-1}{2}$ debe ser un número par, de lo cual $4|(p-1)$ es decir, $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Ejemplo 69 *Resolver*

$$x^2 \equiv -1 \pmod{31}$$

Solución: Como $31 \equiv 3 \pmod{4}$, luego $\overline{-1} \in \not\subseteq_{31}$, es decir, el conjunto solución es vacío.

Teorema 127 *Sea p un número primo impar entonces*

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

Ejemplo 70 *Resolver*

$$x^2 \equiv 2 \pmod{11}$$

Solución: Como $\left(\frac{2}{11}\right) = (-1)^{\frac{11^2-1}{8}} = (-1)^{15} = -1$, luego $\overline{-1} \in \not\subseteq_{11}$, es decir, el conjunto solución es vacío.

Teorema 128 (Reciprocidad Cuadrática) *Sean p, q dos números primos impares distintos*

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\frac{q-1}{2}\right)}$$

o bien

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\frac{q-1}{2}\right)} \left(\frac{q}{p}\right)$$

Ejemplo 71 *Calcular*

$$\left(\frac{31}{1009}\right)$$

Solución: Usando reciprocidad cuadrática tenemos

$$\begin{aligned}\left(\frac{31}{1009}\right) &= (-1)^{\binom{31-1}{2}\binom{1009-1}{2}} \left(\frac{1009}{31}\right) \\ \left(\frac{31}{1009}\right) &= (-1)^{(15)(504)} \left(\frac{31 \cdot 32 + 17}{31}\right) \\ \left(\frac{31}{1009}\right) &= ((-1)^{504})^{15} \left(\frac{17}{31}\right) = \left(\frac{17}{31}\right)\end{aligned}$$

Aplicando nuevamente

$$\begin{aligned}\left(\frac{17}{31}\right) &= (-1)^{\binom{17-1}{2}\binom{31-1}{2}} \left(\frac{31}{17}\right) \\ \left(\frac{17}{31}\right) &= (-1)^{(8)(15)} \left(\frac{17 \cdot 1 + 14}{17}\right) \\ \left(\frac{17}{31}\right) &= ((-1)^8)^{15} \left(\frac{14}{17}\right) = \left(\frac{2 \cdot 7}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \left(\frac{7}{17}\right)\end{aligned}$$

Pero

$$\left(\frac{7}{17}\right) = (-1)^{\binom{7-1}{2}\binom{17-1}{2}} \left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right)$$

Pero tenemos

$$\left(\frac{3}{7}\right) = -1 ; \left(\frac{2}{17}\right) = (-1)^{\frac{17^2-1}{8}} = (-1)^{36} = 1$$

de esta manera obtenemos

$$\left(\frac{31}{1009}\right) = \left(\frac{17}{31}\right) = \left(\frac{14}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \left(\frac{7}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \left(\frac{3}{7}\right) = -1$$

3.6. Ejercicios Desarrollados

Ejemplo 72 *Resolver en $\mathbb{Z}_{25}$:*

$$\bar{x} + 4\bar{1} = \bar{17}$$

Solución:

$$\begin{aligned}\bar{x} + 4\bar{1} &= \bar{17} \\ \bar{x} &= \bar{17} - 4\bar{1} \\ \bar{x} &= -\bar{24}; \quad -24 + 25 = 1 \\ \bar{x} &= \bar{1}\end{aligned}$$

Ejemplo 73 Resolver:

$$\left. \begin{aligned} 2x + 3y + z &\equiv 8 \pmod{17} \\ x + 4y + 5z &\equiv 5 \pmod{17} \\ 3x + 8y - z &\equiv 0 \pmod{17} \end{aligned} \right\}$$

Solución: Despejando z en la primera congruencia tenemos

$$z \equiv 8 - 2x - 3y \pmod{17}$$

reemplazando en la segunda congruencia tenemos

$$\begin{aligned} x + 4y + 5 \cdot (8 - 2x - 3y) &\equiv 5 \pmod{17} \\ x + 4y + 40 - 10x - 15y &\equiv 5 \pmod{17} \\ -9x &\equiv -35 + 11y \pmod{17} \\ 8x &\equiv 16 + 11y \pmod{17} \quad / \cdot -2 \\ -16x &\equiv -32 - 22y \pmod{17} \\ x &\equiv 2 + 12y \pmod{17} \end{aligned}$$

Ahora reemplazando x en $z \equiv 8 - 2x - 3y \pmod{17}$

$$\begin{aligned} z &\equiv 8 - 2 \cdot (2 + 12y) - 3y \pmod{17} \\ z &\equiv 8 - 4 - 24y - 3y \pmod{17} \\ z &\equiv 4 - 27y \pmod{17} \\ z &\equiv 4 + 7y \pmod{17} \end{aligned}$$

Ahora reemplazamos $x \equiv 2 + 12y \pmod{17}$ y $z \equiv 4 + 7y \pmod{17}$ en la tercera congruencia, y obtenemos

$$\begin{aligned} 3x + 8y - z &\equiv 0 \pmod{17} \\ 3 \cdot (2 + 12z) + 8y - (4 + 7y) &\equiv 0 \pmod{17} \\ 6 + 36y + 8y - 4 - 7y &\equiv 0 \pmod{17} \\ 37y &\equiv -2 \pmod{17} \\ 3y &\equiv 15 \pmod{17} \\ y &\equiv 5 \pmod{17} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 + 12y \pmod{17} & z &\equiv 4 + 7y \pmod{17} \\ x &\equiv 2 + 12 \cdot 5 \pmod{17} & z &\equiv 4 + 7 \cdot 5 \pmod{17} \\ x &\equiv 62 \pmod{17} & z &\equiv 39 \pmod{17} \\ x &\equiv 11 \pmod{17} & z &\equiv 5 \pmod{17} \end{aligned}$$

De esta manera se tiene que

$$x \equiv 11 \pmod{17} \quad y \equiv 5 \pmod{17} \quad z \equiv 5 \pmod{17}$$

Ejemplo 74 Hacer la tabla de los grupos:

a) $(\mathbb{Z}_7, +)$

Solución:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{6}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$

b) $(\mathbb{Z}_{13}, +)$

Solución:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{6}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{7}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{8}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$
$\bar{9}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$
$\bar{10}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$
$\bar{11}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$
$\bar{12}$	$\bar{12}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$

c) $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_7), \cdot)$

Solución:

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{5}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{5}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{6}$	$\bar{6}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Ejemplo 75 Calcular el reticulado de los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{12}, +)$

Solución: $\mathcal{H} \leq \mathcal{G} = (\mathbb{Z}_{12}, +) \Leftrightarrow |\mathcal{H}|/|\mathcal{G}| = 12$ luego $|\mathcal{H}| \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_{12} &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}\} & \langle \bar{0} \rangle &= \{\bar{0}\} \\ \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}\} & \langle \bar{2} \rangle &= \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{3} \rangle &= \{\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{0}\} & \langle \bar{4} \rangle &= \{\bar{4}, \bar{8}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{5} \rangle &= \{\bar{5}, \bar{10}, \bar{3}, \bar{8}, \bar{1}, \bar{6}, \bar{11}, \bar{4}, \bar{9}, \bar{2}, \bar{7}, \bar{0}\} & \langle \bar{6} \rangle &= \{\bar{6}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{7} \rangle &= \{\bar{7}, \bar{2}, \bar{9}, \bar{4}, \bar{11}, \bar{6}, \bar{1}, \bar{8}, \bar{3}, \bar{10}, \bar{5}, \bar{0}\} & \langle \bar{8} \rangle &= \{\bar{8}, \bar{4}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{9} \rangle &= \{\bar{9}, \bar{6}, \bar{3}, \bar{0}\} & \langle \bar{10} \rangle &= \{\bar{10}, \bar{8}, \bar{6}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{11} \rangle &= \{\bar{11}, \bar{10}, \bar{9}, \bar{8}, \bar{7}, \bar{6}, \bar{5}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{0}\} \end{aligned}$$

orden	subgrupo
1	$\langle \bar{0} \rangle$
2	$\langle \bar{6} \rangle$
3	$\langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{8} \rangle$
4	$\langle \bar{3} \rangle, \langle \bar{9} \rangle$
6	$\langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{10} \rangle$
12	$\langle \bar{1} \rangle, \langle \bar{5} \rangle, \langle \bar{7} \rangle, \langle \bar{11} \rangle$

$$\begin{aligned} \langle \bar{0} \rangle &\subset \langle \bar{6} \rangle \subset \langle \bar{3} \rangle \subset \langle \bar{1} \rangle \\ \langle \bar{0} \rangle &\subset \langle \bar{4} \rangle \subset \langle \bar{2} \rangle \subset \langle \bar{1} \rangle \\ \langle \bar{0} \rangle &\subset \langle \bar{6} \rangle \subset \langle \bar{2} \rangle \subset \langle \bar{1} \rangle \end{aligned}$$

Reticulado:

Ejemplo 76 Calcular el reticulado de los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{10}, +)$

Solución: $\mathcal{H} \leq \mathcal{G} = (\mathbb{Z}_{10}, +) \Leftrightarrow |\mathcal{H}|/|\mathcal{G}| = 10$, luego $|\mathcal{H}| \in \{1, 2, 5, 10\}$,
 $\mathbb{Z}_{10} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}\}$.

$$\begin{aligned} \langle \bar{0} \rangle &= \{\bar{0}\} & \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}\} \\ \langle \bar{2} \rangle &= \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{0}\} & \langle \bar{3} \rangle &= \{\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{2}, \bar{5}, \bar{8}, \bar{1}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{4} \rangle &= \{\bar{4}, \bar{8}, \bar{2}, \bar{6}, \bar{0}\} & \langle \bar{5} \rangle &= \{\bar{5}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{6} \rangle &= \{\bar{6}, \bar{2}, \bar{8}, \bar{4}, \bar{0}\} & \langle \bar{7} \rangle &= \{\bar{7}, \bar{4}, \bar{1}, \bar{8}, \bar{5}, \bar{2}, \bar{9}, \bar{6}, \bar{3}, \bar{0}\} \\ \langle \bar{8} \rangle &= \{\bar{8}, \bar{6}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\} & \langle \bar{9} \rangle &= \{\bar{9}, \bar{8}, \bar{7}, \bar{6}, \bar{5}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{0}\} \end{aligned}$$

orden	subgrupo
1	$\langle \bar{0} \rangle$
2	$\langle \bar{5} \rangle$
5	$\langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{6} \rangle, \langle \bar{8} \rangle$
10	$\langle \bar{1} \rangle, \langle \bar{3} \rangle, \langle \bar{7} \rangle, \langle \bar{9} \rangle$

$$\langle \bar{0} \rangle \subset \langle \bar{5} \rangle \subset \langle \bar{2} \rangle \subset \langle \bar{1} \rangle$$

Reticulado:

$$\langle \bar{0} \rangle \rightarrow \langle \bar{5} \rangle \rightarrow \langle \bar{2} \rangle \rightarrow \langle \bar{1} \rangle$$

Ejemplo 77 Determinar subgrupos de $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{13}), \cdot)$

Solución: $\mathcal{H} \leq \mathcal{G} = (\mathbb{Z}_{13}^*, \cdot) \Leftrightarrow |\mathcal{H}|/|\mathcal{G}| = 12$ luego $|\mathcal{H}| \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$,
 $\mathbb{Z}_{13}^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}\}$

$$\begin{aligned} \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{1}\} & \langle \bar{2} \rangle &= \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{12}, \bar{11}, \bar{9}, \bar{5}, \bar{10}, \bar{7}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{3} \rangle &= \{\bar{3}, \bar{9}, \bar{1}\} & \langle \bar{4} \rangle &= \{\bar{4}, \bar{3}, \bar{12}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{5} \rangle &= \{\bar{5}, \bar{12}, \bar{8}, \bar{1}\} & \langle \bar{6} \rangle &= \{\bar{6}, \bar{10}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{2}, \bar{12}, \bar{7}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{4}, \bar{11}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{7} \rangle &= \{\bar{7}, \bar{10}, \bar{5}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{6}, \bar{3}, \bar{8}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{1}\} & \langle \bar{8} \rangle &= \{\bar{8}, \bar{12}, \bar{5}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{9} \rangle &= \{\bar{9}, \bar{3}, \bar{1}\} & \langle \bar{10} \rangle &= \{\bar{10}, \bar{9}, \bar{12}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{11} \rangle &= \{\bar{11}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{12}, \bar{2}, \bar{9}, \bar{8}, \bar{10}, \bar{6}, \bar{1}\} & \langle \bar{12} \rangle &= \{\bar{12}, \bar{1}\} \end{aligned}$$

orden	subgrupo
1	$\langle \bar{1} \rangle$
2	$\langle \bar{12} \rangle$
3	$\langle \bar{3} \rangle, \langle \bar{9} \rangle$
4	$\langle \bar{5} \rangle, \langle \bar{8} \rangle$
6	$\langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{10} \rangle$
12	$\langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{6} \rangle, \langle \bar{7} \rangle, \langle \bar{11} \rangle$

Ejemplo 78 Hacer la tabla de:

a) $\square_{15} = \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{15})\}$ Como

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{15}) &= \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{14}\} \\ \square_{15} &= \{\bar{1}, \bar{4}\} \end{aligned}$$

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$

b) $\square_{13} = \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{13})\}$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{13}) &= \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}\} \\ \square_{13} &= \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{9}, \bar{3}, \bar{12}, \bar{10}\} \end{aligned}$$

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{12}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{12}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$	$\bar{12}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{10}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{12}$	$\bar{3}$	$\bar{10}$	$\bar{1}$	$\bar{9}$
$\bar{9}$	$\bar{9}$	$\bar{1}$	$\bar{10}$	$\bar{3}$	$\bar{12}$	$\bar{4}$
$\bar{10}$	$\bar{10}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{12}$	$\bar{9}$	$\bar{3}$
$\bar{12}$	$\bar{12}$	$\bar{10}$	$\bar{9}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$

Ejemplo 79 Calcular los elementos, generadores y hacer la tabla de:

a) $\square_{16} = \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{16})\}$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{16}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{15}\}$$

$$\square_{16} = \{\bar{1}, \bar{9}\}$$

$$\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{1}\} \quad \langle \bar{9} \rangle = \{\bar{9}, \bar{1}\}$$

El generador del grupo $\square_{16}$ es $\bar{9}$.

·	$\bar{1}$	$\bar{9}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{9}$
$\bar{9}$	$\bar{9}$	$\bar{1}$

b) $\square_{26} = \{\bar{x}^2 \mid \bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{26})\}$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{26}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{15}, \bar{17}, \bar{19}, \bar{21}, \bar{23}, \bar{25}\}$$

$$\square_{26} = \{\bar{1}, \bar{9}, \bar{25}, \bar{23}, \bar{3}, \bar{17}\}$$

$$\begin{aligned} \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{1}\}; & \langle \bar{9} \rangle &= \{\bar{9}, \bar{3}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{25} \rangle &= \{\bar{25}, \bar{1}\}; & \langle \bar{23} \rangle &= \{\bar{23}, \bar{9}, \bar{25}, \bar{3}, \bar{17}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{3} \rangle &= \{\bar{3}, \bar{9}, \bar{1}\}; & \langle \bar{17} \rangle &= \{\bar{17}, \bar{3}, \bar{25}, \bar{9}, \bar{23}, \bar{1}\} \end{aligned}$$

Generadores del grupo de los $\square_{26}$ son $\bar{17}, \bar{23}$.

·	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$	$\bar{17}$	$\bar{23}$	$\bar{25}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$	$\bar{17}$	$\bar{23}$	$\bar{25}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$	$\bar{1}$	$\bar{25}$	$\bar{17}$	$\bar{23}$
$\bar{9}$	$\bar{9}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{23}$	$\bar{25}$	$\bar{17}$
$\bar{17}$	$\bar{17}$	$\bar{25}$	$\bar{23}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{9}$
$\bar{23}$	$\bar{23}$	$\bar{17}$	$\bar{25}$	$\bar{1}$	$\bar{9}$	$\bar{3}$
$\bar{25}$	$\bar{25}$	$\bar{23}$	$\bar{17}$	$\bar{9}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$

Ejemplo 80 Hacer la tabla y determinar raíces primitivas de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$

Solución: $18 = 2 \cdot 3^2$, por lo tanto cumple el teorema 110, es decir $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$ es un grupo cíclico.

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18}) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{18} \mid (\bar{a}, 18) = 1\}, \quad |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})| = \phi(18)$$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18}) = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{17}\}$$

·	$\bar{1}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{11}$	$\bar{13}$	$\bar{17}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{11}$	$\bar{13}$	$\bar{17}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{17}$	$\bar{1}$	$\bar{11}$	$\bar{13}$
$\bar{7}$	$\bar{7}$	$\bar{17}$	$\bar{13}$	$\bar{5}$	$\bar{1}$	$\bar{11}$
$\bar{11}$	$\bar{11}$	$\bar{1}$	$\bar{5}$	$\bar{13}$	$\bar{17}$	$\bar{7}$
$\bar{13}$	$\bar{13}$	$\bar{11}$	$\bar{1}$	$\bar{17}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$
$\bar{17}$	$\bar{17}$	$\bar{13}$	$\bar{11}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$	$\bar{1}$

Como $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$ es cíclico, las raíces primitivas es lo mismo que los generadores.

$$\begin{aligned}\phi(\phi(18)) &= \phi(6) \quad 6 = 2 \cdot 3 \\ \phi(\phi(18)) &= 2 \cdot 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \\ \phi(\phi(18)) &= 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 2\end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$ tiene dos raíces primitivas. Ahora buscamos el primer generador de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$.

$$\begin{aligned}\langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{1}\} \\ \langle \bar{5} \rangle &= \{\bar{5}, \bar{7}, \bar{17}, \bar{13}, \bar{11}, \bar{1}\}\end{aligned}$$

Luego, buscamos los primos relativos con $\phi(18)$ que son: 1, 5
Por lo tanto las raíces primitivas de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{18})$ son:

$$\bar{5}^1 = \bar{5}, \quad \bar{5}^5 = \bar{11}$$

Ejemplo 81 Sea $\mathcal{G}$ grupo cíclico. Demostrar que $\mathcal{G}$ es abeliano.

Solución: $\mathcal{G}$ es cíclico existe $g \in \mathcal{G}$ tal que $\mathcal{G} = \langle g \rangle$

Sean $a, b \in \mathcal{G}$ luego existe i, j tales que $a = g^i, b = g^j$

$$a \cdot b = g^i \cdot g^j = g^{i+j} = g^{j+i} = g^j \cdot g^i = b \cdot a$$

Por lo tanto $\mathcal{G}$ es un grupo abeliano.

Ejemplo 82 Determinar todos los $\bar{x} \in \mathbb{Z}_5$ tal que $\bar{x}^3 + \bar{2}\bar{x}^2 + \bar{2} = \bar{0}$

$$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$$\begin{aligned}\bar{x} = \bar{0} &: \bar{0}^3 + \bar{2} \cdot \bar{0}^2 + \bar{2} = \bar{2} \neq \bar{0} \\ \bar{x} = \bar{1} &: \bar{1}^3 + \bar{2} \cdot \bar{1}^2 + \bar{2} = \bar{5} = \bar{0} \\ \bar{x} = \bar{2} &: \bar{2}^3 + \bar{2} \cdot \bar{2}^2 + \bar{2} = \bar{18} = \bar{3} \neq \bar{0} \\ \bar{x} = \bar{3} &: \bar{3}^3 + \bar{2} \cdot \bar{3}^2 + \bar{2} = \bar{47} = \bar{2} \neq \bar{0} \\ \bar{x} = \bar{4} &: \bar{4}^3 + \bar{2} \cdot \bar{4}^2 + \bar{2} = \bar{98} = \bar{3} \neq \bar{0}\end{aligned}$$

Por lo tanto la única solución de en $\mathbb{Z}_5$ tal que $\bar{x}^3 + \bar{2}\bar{x}^2 + \bar{2} = \bar{0}$ es $\bar{x} = \bar{1}$

Ejemplo 83 Calcular el orden de:

a) $\bar{2} \in (\mathbb{Z}_{14}, +)$, recordemos que $|\bar{x}| = \frac{n}{(n,x)}$

$$|\bar{2}| = \frac{14}{(14, 2)} = 7$$

ya que $(14, 2) = 2$. Por lo tanto el orden de $\bar{2}$ es 7.

b) $\overline{12} \in (\mathbb{Z}_{58}, +)$ recordemos que $|\overline{x}| = \frac{n}{(n,x)}$ Calculemos $(12, 58)$

$$58 = 12 \cdot 4 + 10$$

$$12 = 10 \cdot 1 + 2$$

$$10 = 2 \cdot 5$$

Luego $(12, 58) = 2$, de lo cual

$$|\overline{12}| = \frac{58}{(58, 2)} = \frac{58}{2} = 29$$

Por lo tanto el orden de $\overline{12}$ es 29.

Ejemplo 84 Calcular el orden de:

a) $\overline{12} \in (\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{13}), \cdot)$

$$\langle \overline{12} \rangle = \{\overline{12}, \overline{1}\}$$

Por lo tanto el orden de $\overline{12}$ es 2

b) $\overline{3} \in (\mathbb{Z}_{31}^*, \cdot)$

$$\langle \overline{3} \rangle = \{\overline{3}, \overline{9}, \overline{27}, \overline{19}, \overline{26}, \overline{16}, \overline{17}, \overline{20}, \overline{29}, \overline{25}, \overline{13}, \overline{8}, \overline{24}, \overline{10}, \overline{-1}, \dots\}$$

Note que $-1 \in \langle \overline{3} \rangle$, luego en las próximas potencia estarán los inversos de todos los anteriores. Por lo tanto el orden de $\overline{3}$ es 30

Ejemplo 85 Calcular los generadores de: $(\mathbb{Z}_{18}, +)$

Solución: Como $18 = 2 \cdot 3^2$

$$\phi(18) = 2 \cdot 3^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2 \cdot 3^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 6$$

Por lo tanto $(\mathbb{Z}_{18}, +)$ tiene 6 generadores, que van a hacer los primos relativos con 18.

Luego, los generadores de $(\mathbb{Z}_{18}, +)$ son: $\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{17}$

Ejemplo 86 Calcular el número de generadores de: $(\mathbb{Z}_{500}, +)$

Solución: Como $500 = 2^2 \cdot 5^3$

$$\phi(500) = 2^3 \cdot 5^3 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 2^3 \cdot 5^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 200$$

Por lo tanto $(\mathbb{Z}_{500}, +)$ tiene 200 generadores.

Ejemplo 87 Determinar los generadores de:

a) $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{19}), \cdot)$

Como el 19 es primo y el teorema 110 entonces $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{19}), \cdot)$ es un grupo cíclico y el número de generadores esta determinado por la función de Euler aplicada al cardinal del grupo:

$$\phi(19) = 18 = 2 \cdot 3^2$$

$$\phi(\phi(19)) = \phi(18) = 2 \cdot 3^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2 \cdot 3^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 6$$

Por lo tanto $(\mathbb{Z}_{19}^*, \cdot)$ tiene 6 generadores. Buscamos el primer generador:

$$\begin{aligned} \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{1}\} \\ \langle \bar{2} \rangle &= \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{16}, \bar{13}, \bar{7}, \bar{14}, \bar{9}, \bar{18}, \bar{17}, \bar{15}, \bar{11}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{12}, \bar{5}, \bar{10}, \bar{1}\} \end{aligned}$$

Ahora necesitamos los primos relativos con 18 que son: 1, 5, 7, 11, 13, 17.

Por lo tanto los generadores de $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{19}), \cdot)$ son:

$$\bar{2}^1 = \bar{2}, \quad \bar{2}^5 = \bar{16}, \quad \bar{2}^7 = \bar{7}, \quad \bar{2}^{11} = \bar{17}, \quad \bar{2}^{13} = \bar{11}, \quad \bar{2}^{17} = \bar{10}$$

b) $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{24}), \cdot)$

Como 24 no cumple el teorema 110, luego no es cíclico, es decir no tiene generadores.

En forma directa podemos verificar que todos los elementos $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{24})$ tiene orden 2 o 1.

Ejemplo 88 Determinar las raíces primitivas módulo 31

Solución: 31 es primo luego $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{31})$ es cíclico.

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{31}) = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{18}, \bar{19}, \bar{20}, \bar{21}, \bar{22}, \bar{23}, \bar{24}, \dots, \bar{25}, \bar{26}, \bar{27}, \bar{28}, \bar{29}, \bar{30}\}$$

$$\phi(\phi(31)) = \phi(30); \quad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\phi(\phi(31)) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)$$

$$\phi(\phi(31)) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 8$$

Por lo tanto $\mathbb{Z}_{31}$ tiene 8 raíces primitivas. Buscamos el primer generador de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{31})$.

$$\begin{aligned} \langle \bar{1} \rangle &= \{\bar{1}\} \\ \langle \bar{2} \rangle &= \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{16}, \bar{1}\} \\ \langle \bar{3} \rangle &= \{\bar{3}, \bar{9}, \bar{27}, \bar{19}, \bar{26}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{20}, \bar{29}, \bar{25}, \bar{13}, \bar{8}, \bar{24}, \bar{10}, \bar{30}, \bar{28}, \bar{22}, \bar{4}, \bar{12}, \bar{5}, \bar{15}, \bar{14}, \bar{11}, \bar{2}, \bar{6}, \bar{18}, \bar{23}, \bar{7}, \bar{21}, \bar{1}\} \end{aligned}$$

Luego, buscamos los primos relativos con $\phi(31)$ que son: 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Por lo tanto las raíces primitivas módulo 31 son:

$$\bar{3}^1 = \bar{3}, \quad \bar{3}^7 = \bar{17}, \quad \bar{3}^{11} = \bar{13}, \quad \bar{3}^{13} = \bar{24}, \quad \bar{3}^{17} = \bar{22}, \quad \bar{3}^{19} = \bar{12}, \quad \bar{3}^{23} = \bar{11}, \quad \bar{3}^{29} = \bar{21}$$

Ejemplo 89 Determinar el resto al dividir $(100^{40} + 8)^{78}$ por 19

Solución: $100 \equiv 5 \pmod{19}$ y $(5, 19) = 1$ por lo tanto $5^{\phi(19)} \equiv 5^{18} \equiv 1 \pmod{19}$, además $40 = 18 \cdot 2 + 4$

$$5^{40} + 8 \equiv 5^{18 \cdot 2 + 4} + 8 \equiv (5^{18})^2 \cdot 5^4 + 8 \equiv 5^4 + 8 \equiv (25)^2 + 8 \equiv 36 + 8 \equiv 6 \pmod{19}$$

Además $(6, 19) = 1$, luego tenemos $6^{\phi(19)} \equiv 6^{18} \equiv 1 \pmod{19}$

$$6^{78} \equiv 6^{18 \cdot 4 + 6} \equiv (6^{18})^4 \cdot 6^6 \equiv 6^6 \equiv (36)^3 \equiv (17)^3 \equiv 11 \pmod{19}$$

Luego hemos demostrado que

$$(100^{40} + 8)^{78} \equiv 6^{78} \equiv 11 \pmod{19}$$

Por lo tanto el resto al dividir $(100^{40} + 8)^{78}$ por 19 es 11

Ejemplo 90 Determinar el resto al dividir $3^{251} + 2^{501} + 5^{61}$ por 7

Solución: Sabemos que $(2, 7) = (3, 7) = (5, 7) = 1$, además $\phi(7) = 6$, luego tenemos

$$3^{251} \equiv 3^{6 \cdot 41 + 5} \equiv 3^5 \equiv 5 \pmod{7}$$

$$2^{501} \equiv 2^{6 \cdot 83 + 3} \equiv 2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$5^{61} \equiv 5^{6 \cdot 10 + 1} \equiv 5^1 \equiv 5 \pmod{7}$$

Ahora tenemos

$$3^{251} + 2^{501} + 5^{61} \equiv 5 + 1 + 5 \equiv 11 \equiv 4 \pmod{7}$$

Por lo tanto el resto al dividir $3^{251} + 2^{501} + 5^{61}$ por 7 es 4

Ejemplo 91 Probar que si n y 7 son primos relativos entonces $7 | n^6 - 1$

Solución: Como $(n, 7) = 1$, luego tenemos que $n^{\phi(7)} \equiv 1 \pmod{7}$

$$n^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$n^6 = 1 + 7 \cdot q \quad q \in \mathbb{Z}$$

$$n^6 - 1 = 7 \cdot q$$

Por lo tanto se tiene que $7 | n^6 - 1$

Ejemplo 92 Si $(a, p) = 1$. Calcular $\overline{1 + a + a^2 + \dots + a^{p-1}}$ en $\mathbb{Z}_p$

Solución: Si $a = 1$ $\overline{1 + a + a^2 + \dots + a^{p-1}} = \overline{1 + 1 + \dots + 1} = \overline{p \cdot 1} = \overline{0}$

Si $a \neq 1$ podemos amplificar por $\left(\frac{1-a}{1-a}\right)$ la expresión

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{p-1} = 1 / \cdot \left(\frac{1-a}{1-a}\right)$$

de lo cual obtenemos

$$\frac{1-a^p}{1-a} = 1$$

Pero $(a, p) = 1$ luego se tiene que $a^p \equiv a \pmod{p}$, por lo tanto

$$\overline{1 + a + a^2 + \dots + a^{p-1}} = \overline{\frac{1-a}{1-a}} = \overline{1}$$

Ejemplo 93 *Resolver:*

a) $x^{20} + x^{13} + x^7 + x \equiv 0 \pmod{7}$

Solución: Como 7 es un número primo tenemos que

$$x^{20} + x^{13} + x^7 + x \equiv 0 \pmod{7} \Leftrightarrow x(x^{19} + x^{12} + x^6 + 1) \equiv 0 \pmod{7}$$

Luego

$$x^{19} + x^{12} + x^6 + 1 \equiv 0 \pmod{7} \quad \vee \quad x \equiv 0 \pmod{7}$$

Sea x tal que $(x, 7) = 1$ entonces tenemos que $x^6 \equiv 1 \pmod{7}$, de lo cual tenemos

$$x^{6q+r} \equiv x^r \pmod{7},$$

Reemplazando se tiene

$$x^{19} + x^{12} + x^6 + 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x + 1 + 1 + 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

Por lo tanto las soluciones de $x^{20} + x^{13} + x^7 + x \equiv 0 \pmod{7}$ son

$$x \equiv 0 \pmod{7}, \quad x \equiv 4 \pmod{7}$$

b) $x^{11} + x^8 + 5 \equiv 0 \pmod{7}$

Solución: cero no es solución, luego

$$x^{11} + x^8 + 5 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x^5 + x^2 + 5 \equiv 0 \pmod{7}$$

Evaluando tenemos

$$x = 0 : 0^5 + 0^2 + 5 = 5 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

$$x = 1 : 1^5 + 1^2 + 5 = 7 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x = 2 : 2^5 + 2^2 + 5 = 41 = 6 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

$$x = 3 : 3^5 + 3^2 + 5 = 257 = 5 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

$$x = 4 : 4^5 + 4^2 + 5 = 1045 = 2 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

$$x = 5 : 5^5 + 5^2 + 5 = 3155 = 5 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

$$x = 6 : 6^5 + 6^2 + 5 = 7817 = 5 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

Por lo tanto la solución de $x^{11} + x^8 + 5 \equiv 0 \pmod{7}$ es

$$x \equiv 1 \pmod{7}$$

Ejemplo 94 Resolver:

$$\left. \begin{aligned} 5x &\equiv 2 \pmod{7} \\ 8x &\equiv 4 \pmod{9} \\ 2x &\equiv 3 \pmod{11} \end{aligned} \right\}$$

Solución: Son primos relativos, ya que $(9, 11) = 1$, $(9, 7) = 1$, $(11, 7) = 1$

$$\begin{array}{lll} 5x \equiv 2 \pmod{7} / \cdot 3 & 8x \equiv 4 \pmod{9} & 2x \equiv 3 \pmod{11} / \cdot 6 \\ 15x \equiv 6 \pmod{7} & -x \equiv 4 \pmod{9} / \cdot -1 & 12x \equiv 18 \pmod{11} \\ x \equiv 6 \pmod{7} & x \equiv 5 \pmod{9} & x \equiv 7 \pmod{11} \end{array}$$

Por lo tanto hay que resolver

$$\left. \begin{aligned} x &\equiv 6 \pmod{7} \\ x &\equiv 5 \pmod{9} \\ x &\equiv 7 \pmod{11} \end{aligned} \right\}$$

Para ello aplicamos el teorema chino de los restos

$$a_1 = 6, a_2 = 5, a_3 = 7, m_1 = 7, m_2 = 9, m_3 = 11, m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 = 693$$

$$\begin{array}{lll} \frac{m}{m_1} \cdot b_1 \equiv 1 \pmod{m_1} & \frac{m}{m_2} \cdot b_2 \equiv 1 \pmod{m_2} & \frac{m}{m_3} \cdot b_3 \equiv 1 \pmod{m_3} \\ 99 \cdot b_1 \equiv 1 \pmod{7} & 77 \cdot b_2 \equiv 1 \pmod{9} & 63 \cdot b_3 \equiv 1 \pmod{11} \\ b_1 \equiv 1 \pmod{7} & 5 \cdot b_2 \equiv 1 \pmod{9} / \cdot 2 & 8b_3 \equiv 1 \pmod{11} / \cdot 7 \\ & b_2 \equiv 2 \pmod{9} & b_3 \equiv 7 \pmod{11} \end{array}$$

$$\begin{aligned} x_0 &= a_1 \cdot b_1 \cdot \frac{m}{m_1} + a_2 \cdot b_2 \cdot \frac{m}{m_2} + a_3 \cdot b_3 \cdot \frac{m}{m_3} \\ x_0 &= 6 \cdot 1 \cdot 99 + 15 \cdot 2 \cdot 77 + 7 \cdot 7 \cdot 63 \\ x_0 &= 4451 \\ x &\equiv x_0 \pmod{m} \\ x &\equiv 4451 \pmod{252} \\ x &\equiv 293 \pmod{252} \end{aligned}$$

Ejemplo 95 Sea p primo impar, $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$. Si el orden multiplicativo de $\bar{a}$ es 3.

Demostrar $a^2 + a + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ y $\overline{a+1}$ tiene orden multiplicativo 6.

Solución: Como se tiene que $|\bar{a}| = 3$, luego $\bar{a}^3 = 1$.

$$\begin{aligned} a^3 &\equiv 1 \pmod{p} \\ a^3 - 1 &\equiv 0 \pmod{p} \\ (a - 1) \cdot (a^2 + a + 1) &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned}$$

Pero $a \not\equiv 1 \pmod{p}$, ya que $|\bar{a}| = 3$. Luego

$$a^2 + a + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

Calculemos el orden de $\overline{a+1}$.

$$\begin{aligned}(a+1)^2 &= a^2 + 2a + 1 \equiv a \pmod{p} \\ ((a+1)^2)^3 &\equiv a^3 \pmod{p} \\ (a+1)^6 &\equiv 1 \pmod{p}\end{aligned}$$

Nos falta verificar que no es otro divisor de 6. Para ello vemos que $(a+1)^2 \equiv a \pmod{p}$, por lo tanto $(a+1)^2 \not\equiv 1 \pmod{p}$, además si multiplicamos por $a+1$ obtenemos que $(a+1)^3 \equiv a^2 + a \equiv -1 \pmod{p}$, es decir, $(a+1)^3 \not\equiv 1 \pmod{p}$

Por lo tanto $|\overline{a+1}| = 6$.

Ejemplo 96 Determine el número de soluciones de:

a) $x^2 \equiv 2 \pmod{31}$

Necesitamos saber si 2 es un cuadrado o no

$$\left(\frac{2}{31}\right) = (-1)^{\frac{31^2-1}{8}} = 1$$

Por lo tanto $2 \in \square_{31}$ luego $x^2 \equiv 2 \pmod{31}$ tiene dos soluciones.

b) $x^2 \equiv 3 \pmod{31}$

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{31}\right) \cdot \left(\frac{31}{3}\right) &= (-1)^{\frac{31-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}}; \quad 31 \equiv 1 \pmod{3} \\ \left(\frac{3}{31}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) &= -1\end{aligned}$$

Como $\left(\frac{1}{3}\right) = 1$ implica que $\left(\frac{3}{31}\right) = -1$

Por lo tanto $3 \notin \square_{31}$, es decir $x^2 \equiv 3 \pmod{31}$ tiene solución vacía.

c) $x^2 \equiv 429 \pmod{563}$

429 se descompone como producto de primo en $3 \cdot 11 \cdot 13$

$$\left(\frac{429}{563}\right) = \left(\frac{3}{563}\right) \cdot \left(\frac{11}{563}\right) \cdot \left(\frac{13}{563}\right)$$

Veremos cada una por separado

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{563}\right) \cdot \left(\frac{563}{3}\right) &= (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}}; \quad 563 \equiv 2 \pmod{3} \\ \left(\frac{3}{563}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) &= -1\end{aligned}$$

Pero $\left(\frac{2}{3}\right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = -1$, de donde se tiene que $\left(\frac{3}{563}\right) = 1$

$$\begin{aligned}\left(\frac{11}{563}\right) \cdot \left(\frac{563}{11}\right) &= (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}}; \quad 563 \equiv 2 \pmod{11} \\ \left(\frac{11}{563}\right) \cdot \left(\frac{2}{11}\right) &= -1\end{aligned}$$

Pero $\left(\frac{2}{11}\right) = (-1)^{\frac{11^2-1}{8}} = -1$, luego tenemos $\left(\frac{11}{563}\right) = 1$

$$\begin{aligned}\left(\frac{13}{563}\right) \cdot \left(\frac{563}{13}\right) &= (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{13-1}{2}}; \quad 563 \equiv 4 \pmod{13} \\ \left(\frac{13}{563}\right) \cdot \left(\frac{4}{13}\right) &= 1\end{aligned}$$

Como $\left(\frac{4}{13}\right) = 1$ entonces $\left(\frac{13}{563}\right) = 1$

Reemplazando tenemos

$$\left(\frac{429}{563}\right) = \left(\frac{3}{563}\right) \cdot \left(\frac{11}{563}\right) \cdot \left(\frac{13}{563}\right) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

Por lo tanto $429 \in \square_{563}$, luego $x^2 \equiv 429 \pmod{563}$ tiene dos soluciones.

d) $2x^2 + 4x + 3 \equiv 0 \pmod{17}$

El Discriminante de la ecuación $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ es $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

Luego tenemos que

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 16 - 24 = -8 = (-1) \cdot 2^3$$

Notemos que $2^3 \in \square_{17}$ si y sólo si $2 \in \square_{17}$

$$\left(\frac{-8}{17}\right) = \left(\frac{-1}{17}\right) \cdot \left(\frac{2^3}{17}\right) = (-1)^{\frac{17-1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{17^2-1}{8}} = 1 \cdot 1$$

Por lo tanto

$$\left(\frac{-8}{17}\right) = \left(\frac{-1}{17}\right) \cdot \left(\frac{2^3}{17}\right) = 1$$

de lo cual tenemos que $-8 \in \square_{17}$ y por lo tanto $2x^2 + 4x + 3 \equiv 0 \pmod{17}$ tiene dos soluciones.

Ejemplo 97 Resolver las siguientes ecuaciones

Solución: Sea $x \in \mathbb{Z}$, tales que

a) $x^2 \equiv 2 \pmod{311}$

Veamos si 2 es un cuadrado o no.

$$\left(\frac{2}{311}\right) = (-1)^{\frac{311^2-1}{8}} = 1$$

Luego $2 \in \square_{311}$, por lo tanto $x^2 \equiv 2 \pmod{311}$ tiene dos soluciones.

Veremos ahora cuales son, para ello notemos que $2 \equiv 4356 \equiv 66^2 \pmod{311}$

$$\begin{aligned} x^2 &\equiv 2 \pmod{311} \\ x^2 &\equiv 66^2 \pmod{311} \\ x^2 - 66^2 &\equiv 0 \pmod{311} \\ (x - 66) \cdot (x + 66) &\equiv 0 \pmod{311} \end{aligned}$$

Como 311 es un número primo, entonces tenemos

$$\begin{aligned} x - 66 &\equiv 0 \pmod{311} \quad \vee \quad x + 66 \equiv 0 \pmod{311} \\ x &\equiv 66 \pmod{311} \quad \vee \quad x \equiv -66 \pmod{311} \\ x &\equiv 66 \pmod{311} \quad \vee \quad x \equiv 245 \pmod{311} \end{aligned}$$

Por lo tanto las soluciones de $x^2 \equiv 2 \pmod{311}$ son:

$$x \equiv 66 \pmod{311}, \quad x \equiv 245 \pmod{311}$$

b) $x^2 \equiv 5 \pmod{19}$

Veamos si 5 es un cuadrado o no

$$\left(\frac{5}{19}\right) \cdot \left(\frac{19}{5}\right) = (-1)^{\frac{19-1}{2} \cdot \frac{5-1}{2}} = 1$$

pero $19 \equiv 4 \equiv 2^2 \pmod{5}$, de lo cual obtenemos

$$1 = \left(\frac{5}{19}\right) \cdot \left(\frac{19}{5}\right) = \left(\frac{5}{19}\right) \cdot \left(\frac{2^2}{5}\right) = \left(\frac{5}{19}\right)$$

Luego $5 \in \square_{19}$, por lo tanto $x^2 \equiv 5 \pmod{19}$ tiene dos soluciones.

Veremos ahora cuales son, para ello notemos que $5 \equiv 81 \equiv 9^2 \pmod{19}$

$$\begin{aligned} x^2 &\equiv 5 \pmod{19} \\ x^2 &\equiv 9^2 \pmod{19} \\ x^2 - 9^2 &\equiv 0 \pmod{19} \\ (x - 9) \cdot (x + 9) &\equiv 0 \pmod{19} \end{aligned}$$

Como 19 es un número primo, entonces tenemos

$$\begin{aligned} x - 9 &\equiv 0 \pmod{19} \quad \vee \quad x + 9 \equiv 0 \pmod{19} \\ x &\equiv 9 \pmod{19} \quad \vee \quad x \equiv -9 \pmod{19} \end{aligned}$$

Por lo tanto las soluciones de $x^2 \equiv 5 \pmod{19}$ son:

$$x \equiv 9 \pmod{19}, \quad x \equiv 10 \pmod{19}$$

c) $3x^2 + 4x + 5 \equiv 0 \pmod{31}$

Calculemos el discriminante

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 3 \cdot 5 = 16 - 60 = -44 \equiv 18 \pmod{31}$$

Veremos si es un cuadrado.

$$\left(\frac{18}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right) \cdot \left(\frac{3^2}{31}\right) = (-1)^{\frac{31^2-1}{8}} \cdot 1 = 1$$

Luego $18 = -44 \in \square_{31}$, por lo tanto $3x^2 + 4x + 5 \equiv 0 \pmod{31}$ tiene dos soluciones.

Como p es impar, sabemos que,

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow (2ax + b)^2 = \Delta \pmod{p}$$

Reemplazando obtenemos

$$\begin{aligned} 3x^2 + 4x + 5 &\equiv 0 \pmod{31} \\ (6x + 4)^2 &\equiv \Delta \pmod{31} \\ z^2 &\equiv -44 \pmod{31} \quad -44 \equiv 49 \pmod{31} \\ z^2 &\equiv 49 \pmod{31} \\ z^2 - 49 &\equiv 0 \pmod{31} \\ z^2 - 7^2 &\equiv 0 \pmod{31} \\ (z - 7) \cdot (z + 7) &\equiv 0 \pmod{31} \end{aligned}$$

Como 31 es un número primo entonces tenemos

$$\begin{aligned} z &\equiv 7 \pmod{31} \quad \vee \quad z \equiv -7 \pmod{31} \\ 6x + 4 &\equiv 7 \pmod{31} \quad \vee \quad 6x + 4 \equiv -7 \pmod{31} \\ 6x &\equiv 3 \pmod{31} / 26 \quad \vee \quad 6x \equiv -11 \pmod{31} / 26 \\ x &\equiv 78 \pmod{31} \quad \vee \quad x \equiv -286 \pmod{31} \\ x &\equiv 16 \pmod{31} \quad \vee \quad x \equiv 24 \pmod{31} \end{aligned}$$

Por lo tanto las soluciones de $3x^2 + 4x + 5 \equiv 0 \pmod{31}$ son:

$$x \equiv 16 \pmod{31}, \quad x \equiv 24 \pmod{31}$$

d) $x^{32} + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{31}$

Notemos que 0 no es solución, luego las soluciones deben cumplir con $x^{30} \equiv 1 \pmod{31}$, por lo tanto

$$x^{32} + 4x + 2 \equiv x^2 + 4x + 2 \pmod{31}$$

Veamos el discriminante

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 16 - 8 = 8 = 2^3$$

Notemos que $2^3 \in \square_{31}$ si y sólo si $2 \in \square_{31}$

$$\left(\frac{8}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right) = (-1)^{\frac{31^2-1}{8}} = 1$$

Luego tenemos $2^3 \in \square_{31}$, por lo tanto $x^2 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{31}$ tiene dos soluciones.

Sabemos que

$$ax^2 + bx + c = 0 \pmod{p} \Leftrightarrow (2ax + b)^2 = \Delta \pmod{p}$$

$$x^2 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{31}$$

$$(2x + 4)^2 \equiv 8 \pmod{31}$$

$$z^2 \equiv 8 \pmod{31} \quad 8 \equiv 225 \equiv 15^2 \pmod{31}$$

$$z^2 \equiv 15^2 \pmod{31}$$

$$z^2 - 15^2 \equiv 0 \pmod{31}$$

$$(z - 15) \cdot (z + 15) \equiv 0 \pmod{31}$$

Como 31 es un número primo entonces tenemos

$$z \equiv 15 \pmod{31} \quad \vee \quad z \equiv -15 \pmod{31}$$

$$2x + 4 \equiv 15 \pmod{31} \quad \vee \quad 2x + 4 \equiv -15 \pmod{31}$$

$$2x \equiv 11 \pmod{31} / 16 \quad \vee \quad 2x \equiv -19 \pmod{31} / 16$$

$$x \equiv 176 \pmod{31} \quad \vee \quad x \equiv -304 \pmod{31}$$

$$x \equiv 21 \pmod{31} \quad \vee \quad x \equiv 6 \pmod{31}$$

Por lo tanto las soluciones de $x^2 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{31}$ son:

$$x \equiv 21 \pmod{31}, \quad x \equiv 6 \pmod{31}$$

e) $x^4 \equiv 1 \pmod{23}$

$$x^4 \equiv 1 \pmod{23}$$

$$x^4 - 1 \equiv 0 \pmod{23}$$

$$x^4 - 1^4 \equiv 0 \pmod{23}$$

$$(x^2 - 1^2) \cdot (x^2 + 1^2) \equiv 0 \pmod{23}$$

$$(x - 1) \cdot (x + 1) \cdot (x^2 + 1) \equiv 0 \pmod{23}$$

Ya que 23 es un número primo entonces se tiene que

$$\begin{array}{lll} x - 1 \equiv 0 \pmod{23} & x + 1 \equiv 0 \pmod{23} & x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{23} \\ x \equiv 1 \pmod{23} & x \equiv -1 \pmod{23} & x^2 \equiv -1 \pmod{23} \\ & x \equiv 22 \pmod{23} & \end{array}$$

Determinemos si -1 es un cuadrado o no

$$\left(\frac{-1}{23}\right) = (-1)^{\frac{23-1}{2}} = -1$$

Luego $-1 \notin \square_{23}$, por lo tanto $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{23}$ no tiene solución.

De este modo tenemos que las soluciones de $x^4 \equiv 1 \pmod{23}$ son:

$$x \equiv 1 \pmod{23}, \quad x \equiv 22 \pmod{23}$$

f) Resolver $x^4 + x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{11}$

Consideremos el cambio de variable $u = x^2$ luego la tenemos

$$x^4 + x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{11} \Leftrightarrow u^2 + u + 1 \equiv 0 \pmod{11}$$

El discriminante

$$\Delta = 1^2 - 4 = -3 \equiv 8 \pmod{11}$$

Notemos que $2^3 \in \square_{11}$ si y sólo si $2 \in \square_{11}$

$$\left(\frac{8}{11}\right) = \left(\frac{2}{11}\right) = (-1)^{\frac{11^2-1}{8}} = -1$$

Por lo tanto $x^4 + x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{11}$ no tiene solución.

Ejemplo 98 Determinar todos los números primos impares p tal que $p \leq 30$ y $\left(\frac{3}{p}\right) = -1$

Solución: Por reciprocidad cuadrática tenemos

$$\left(\frac{3}{p}\right) \cdot \left(\frac{p}{3}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

Luego

$$\left(\frac{p}{3}\right) = (-1)^{\frac{p+1}{2}}$$

i) $p \equiv 1 \pmod{3}$

$$1 = \left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = (-1)^{\frac{p+1}{2}}$$

Luego $\frac{p+1}{2}$ es par, es decir, $\frac{p+1}{2} = 2 \cdot t \quad t \in \mathbb{Z}$, por ende tenemos que $p = 4 \cdot t - 1$.

Pero $p \equiv 1 \pmod{3}$, luego reemplazando obtenemos $4t - 1 \equiv 1 \pmod{3}$, al simplificar se tiene $t \equiv 2 \pmod{3}$, de este modo $p = 4(3s + 2) - 1 = 12s + 7$

Por lo tanto $p \in \{7, 19\}$

ii) $p \equiv 2 \pmod{3}$

$$-1 = \left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = (-1)^{\frac{p+1}{2}}$$

Luego $\frac{p+1}{2}$ es impar, es decir, $\frac{p+1}{2} = 2 \cdot t + 1 \quad t \in \mathbb{Z}$, así $p = 4 \cdot t + 1$.

Pero $p \equiv 2 \pmod{3}$, luego $4t + 1 \equiv 2 \pmod{3}$, es decir, $t \equiv 1 \pmod{3}$, de lo cual obtenemos $p = 4(3s + 1) + 1 = 12s + 5$

Por lo tanto $p \in \{5, 17, 29\}$

Por lo tanto todos los p primos tal que $\left(\frac{3}{p}\right) = -1$ y $p \leq 30$ son $\{5, 7, 17, 19, 29\}$

Ejemplo 99 Determinar todos los $\alpha \in \mathbb{Z}_{11}$ tal que

$$\left. \begin{array}{l} x - y = \alpha \\ x \cdot y = 1 \end{array} \right\}$$

el sistema en $\mathbb{Z}_{11}$ no tenga solución.

Solución: Despejando de la primera ecuación tenemos $y = x - \alpha$ y reemplazar tenemos

$$\begin{aligned} x \cdot (x - \alpha) &= 1 \\ x^2 - \alpha x &= 1 \\ x^2 - \alpha \cdot x - 1 &= 0 \end{aligned}$$

El discriminante es $\Delta = \alpha^2 + 4$, para que el sistema no tenga solución, es decir,

$$\Delta = \alpha^2 + 4 \notin \square_{11} = \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{9}, \bar{5}, \bar{3}\}$$

$$\begin{array}{l} \alpha = 0 : 0^2 + 4 = 4 \in \square_{11} \\ \alpha = 1 : 1^2 + 4 = 5 \in \square_{11} \\ \alpha = 2 : 2^2 + 4 = 8 \notin \square_{11} \\ \alpha = 3 : 3^2 + 4 = 13 = 2 \notin \square_{11} \\ \alpha = 4 : 4^2 + 4 = 20 = 9 \in \square_{11} \\ \alpha = 5 : 5^2 + 4 = 29 = 7 \notin \square_{11} \\ \alpha = 6 : 6^2 + 4 = 40 = 7 \notin \square_{11} \\ \alpha = 7 : 7^2 + 4 = 53 = 9 \in \square_{11} \\ \alpha = 8 : 8^2 + 4 = 68 = 2 \notin \square_{11} \\ \alpha = 9 : 9^2 + 4 = 85 = 8 \notin \square_{11} \\ \alpha = 10 : 10^2 + 4 = 104 = 5 \in \square_{11} \end{array}$$

Por lo tanto $\alpha \in \{\bar{2}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{9}\}$

Ejemplo 100 Determinar condiciones sobre el primo p tal que $x^4 \equiv 16 \pmod{p}$

a) Tenga dos soluciones.

b) Tenga cuatro soluciones.

Solución: Busquemos los Factores de la expresión

$$\begin{aligned} x^4 &\equiv 16(\text{mod } p) \\ x^4 - 16 &\equiv 0(\text{mod } p) \\ x^4 - 4^2 &\equiv 0(\text{mod } p) \\ (x^2 - 4) \cdot (x^2 + 4) &\equiv 0(\text{mod } p) \\ (x - 2) \cdot (x + 2) \cdot (x^2 + 4) &\equiv 0(\text{mod } p) \end{aligned}$$

Como p es primo tenemos

$$x \equiv 2(\text{mod } p) \vee x \equiv -2(\text{mod } p) \vee x^2 \equiv -4(\text{mod } p)$$

a) Tenga dos soluciones.

El primo debe ser impar y $-4 \notin \square_p$ de lo cual $\left(\frac{-4}{p}\right) = -1$

$$\left(\frac{-4}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot \left(\frac{4}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$$

Luego $\frac{p-1}{2}$ es impar, es decir, $\frac{p-1}{2} = 2 \cdot t + 1 \quad t \in \mathbb{Z}$, de lo cual tenemos $p = 4 \cdot t + 3$.

La ecuación tiene dos soluciones si y sólo si $p \equiv 3(\text{mod } 4)$

b) Tenga cuatro soluciones.

El primo debe ser impar y $-4 \in \square_p$, es decir, $\left(\frac{-4}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$

Luego $\frac{p-1}{2}$ es par, es decir, $\frac{p-1}{2} = 2 \cdot t \quad t \in \mathbb{Z}$, de lo cual tenemos $p = 4 \cdot t + 1$.

La ecuación tiene dos soluciones si y sólo si $p \equiv 1(\text{mod } 4)$

Ejemplo 101 Determine número de solución de

$$\left. \begin{aligned} x^2 + y^2 &\equiv 1(\text{mod } 43) \\ x - y &\equiv 2(\text{mod } 43) \end{aligned} \right\}$$

Solución: Despejando de la segunda ecuación $x \equiv 2 + y(\text{mod } 43)$ y reemplazando en la primera obtenemos

$$\begin{aligned} (2 + y)^2 + y^2 &\equiv 1(\text{mod } 43) \\ 4 + 4y + y^2 + y^2 - 1 &\equiv 0(\text{mod } 43) \\ 2y^2 + 4y + 3 &\equiv 0(\text{mod } 43) \end{aligned}$$

El discriminante

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 16 - 24 = -8 = -1 \cdot 2^3$$

$$\left(\frac{-8}{43}\right) = \left(\frac{-1}{43}\right) \cdot \left(\frac{2^3}{43}\right) = (-1)^{\frac{43-1}{2}} \cdot \left(\frac{2}{43}\right) = (-1) \cdot (-1)^{\frac{43^2-1}{8}} (-1) \cdot (-1) = 1$$

Por lo tanto

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod{43} \\ x - y \equiv 2 \pmod{43} \end{array} \right|$$

tiene dos soluciones.

Ejemplo 102 Sea p un primo impar. Demostrar que si $\delta \in \not\equiv_p$ entonces

$$\not\equiv_p = \delta \square_p$$

Demostración: Recuerde que ambos conjunto tiene igual cardinal, luego basta demostrar una contención

Supongamos que $\bar{x}^2 \cdot \delta$ es un cuadrado, luego

$$\begin{aligned} \delta \cdot \bar{x}^2 &= \bar{a}^2 \quad / \cdot \bar{x}^{-2} \\ \delta &= \bar{a}^2 \cdot \bar{x}^{-2} \\ \delta &= (\bar{a} \cdot \bar{x}^{-1})^2 \end{aligned}$$

De lo cual tenemos que $\delta \in \square_p$, lo que es una contradicción

Por lo tanto

$$\not\equiv_p = \{\bar{x}^2 \cdot \delta \mid \bar{x} \in \mathbb{Z}_p^*\}$$

Ejemplo 103 Determine número de solución de $x^6 + x^3 - 2 \equiv 0 \pmod{37}$

Solución: Realizando el cambio de variable $u = x^3$, obtenemos que

$$x^6 + x^3 - 2 \equiv 0 \pmod{37} \Leftrightarrow u^2 + u - 2 \equiv 0 \pmod{37}$$

Pero $u^2 + u - 2 = (u - 1) \cdot (u + 2)$. Luego

$$\begin{aligned} x^6 + x^3 - 2 &\equiv 0 \pmod{37} \\ (x^3 - 1) \cdot (x^3 + 2) &\equiv 0 \pmod{37} \\ (x - 1) \cdot (x^2 + x + 1) \cdot (x^3 - 2) &\equiv 0 \pmod{37} \end{aligned}$$

Como 37 es primo veamos primero la ecuación de segundo grado $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{37}$, para ello $\Delta = 1 - 4 = -3 = -1 \cdot 3$

$$\left(\frac{-3}{37}\right) = \left(\frac{-1}{37}\right) \cdot \left(\frac{3}{37}\right) = (-1)^{\frac{37-1}{2}} \cdot \left(\frac{3}{37}\right) = -\left(\frac{3}{37}\right)$$

Aplicando reciprocidad cuadrática tenemos

$$\left(\frac{-3}{37}\right) = -\left(\frac{3}{37}\right) = (-1)(-1)^{\frac{37-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{37}{3}\right) = (-1)(-1) \left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

Por lo tanto $-3 \in \square_{37}$ luego la ecuación tiene soluciones distinta de 1.

Ya que 2 no es un cubo, por lo cual $x^3 - 2 \equiv 0 \pmod{37}$ no tiene solución.

De este modo obtenemos que el número de soluciones de $x^6 + x^3 - 2 \equiv 0 \pmod{37}$ es 3.

Ejemplo 104 Determinar todos los $\alpha \in \mathbb{Z}_{13}$, para los cuales la ecuación $x^2 + 2x + \alpha - 1 = 0$ no tiene solución en $\mathbb{Z}_{13}$

Solución: Calculando el discriminante $\Delta = 4 - 4(\alpha - 1) = 4 - 4\alpha + 4 = 8 - 4\alpha$, luego la ecuación no tiene solución si y sólo si $8 - 4\alpha \notin \square_{13} = \{\overline{1}, \overline{4}, \overline{9}, \overline{3}, \overline{12}, \overline{10}\}$

Evaluando todo los α posible obtenemos:

$$\begin{aligned} \alpha = 0 & : 8 - 4 \cdot 0 = 8 \notin \square_{13} \\ \alpha = 1 & : 8 - 4 \cdot 1 = 4 \in \square_{13} \\ \alpha = 2 & : 8 - 4 \cdot 2 = 0 \notin \square_{13} \\ \alpha = 3 & : 8 - 4 \cdot 3 = -4 = 9 \in \square_{13} \\ \alpha = 4 & : 8 - 4 \cdot 4 = -8 = 5 \notin \square_{13} \\ \alpha = 5 & : 8 - 4 \cdot 5 = -12 = 1 \in \square_{13} \\ \alpha = 6 & : 8 - 4 \cdot 6 = -16 = 10 \in \square_{13} \\ \alpha = 7 & : 8 - 4 \cdot 7 = -20 = 6 \notin \square_{13} \\ \alpha = 8 & : 8 - 4 \cdot 8 = -24 = 2 \notin \square_{13} \\ \alpha = 9 & : 8 - 4 \cdot 9 = -28 = 11 \notin \square_{13} \\ \alpha = 10 & : 8 - 4 \cdot 10 = -32 = 7 \notin \square_{13} \\ \alpha = 11 & : 8 - 4 \cdot 11 = -36 = 3 \in \square_{13} \\ \alpha = 12 & : 8 - 4 \cdot 12 = -40 = 12 \in \square_{13} \end{aligned}$$

Por lo tanto $\alpha \in \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{9}, \overline{10}\}$

Ejemplo 105 Determinar generadores y subgrupos de: $\mathcal{C}_{19}$

$$\mathcal{C}_{19} = \{\overline{x}^3 \mid \overline{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{19})\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{19} &= \{\overline{1}, \overline{8}, \overline{7}, \overline{11}, \overline{18}, \overline{12}\} \\ \langle \overline{1} \rangle &= \{\overline{1}\} \\ \langle \overline{8} \rangle &= \{\overline{8}, \overline{7}, \overline{18}, \overline{11}, \overline{12}, \overline{1}\} \\ \langle \overline{7} \rangle &= \{\overline{7}, \overline{11}, \overline{1}\} \\ \langle \overline{11} \rangle &= \{\overline{11}, \overline{7}, \overline{1}\} \\ \langle \overline{18} \rangle &= \{\overline{18}, \overline{1}\} \\ \langle \overline{12} \rangle &= \{\overline{12}, \overline{11}, \overline{18}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{1}\} \end{aligned}$$

Por lo tanto los generadores de $\mathcal{C}_{19}$ son $\overline{8}, \overline{12}$

orden	subgrupo
1	$\langle \overline{1} \rangle$
2	$\langle \overline{18} \rangle$
3	$\langle \overline{7} \rangle, \langle \overline{11} \rangle$
6	$\langle \overline{8} \rangle, \langle \overline{12} \rangle$