Capítulo 4

Números Racionales.

Luego de construir los Números Naturales, se presentaron ciertos problemas como ¿Cuál es el resultado de 3 menos 5?, para poder encontrar una solución se creó a partir de $\mathbb{N}$ el conjunto de los Números Enteros que se representan con el símbolo de $\mathbb{Z}$. Pero la vida cotidiana siguió exigiendo la creación de nuevos conjuntos a partir de los ya conocidos.

Consideremos el conjunto $\mathbb{Z}$ como conjunto base y definamos

$$\mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} - \{0\}$$

a partir de este nuevo conjunto construimos el producto cartesiano

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}^*\}$$

de donde $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ se denominan fracciones

Notación: Sea $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ una mejor notación para los elementos de este nuevo conjunto es

$$(a, b) = \frac{a}{b}$$

Más aún el elemento a se denominará como numerador y b el denominador.

Definición 39 Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, definiremos la siguiente relación dada por

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$$

Propiedad 129 La relación definida anteriormente $\sim$, es una relación de equivalencia.

Demostración:

(i) **La relación $\sim$ es refleja:**

Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$

Como

$$ab = ab$$

entonces

$$\frac{a}{b} \sim \frac{a}{b}$$

luego la relación es refleja.

(ii) **La relación $\sim$ es simétrica:**

Sean $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tales que

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} &\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow cb = ad \\ &\Leftrightarrow \frac{c}{d} \sim \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

(iii) **La relación $\sim$ es transitiva:**

Sean $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tales que

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \wedge \frac{c}{d} \sim \frac{e}{f}$$

Si

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \wedge \frac{c}{d} \sim \frac{e}{f} &\Leftrightarrow ad = cb \wedge cf = ed \\ &adf = cbf \wedge cfb = edb. \end{aligned}$$

Por lo tanto $adf = edb$, cancelando obtenemos $af = eb$, luego

$$\frac{a}{b} \sim \frac{e}{f}.$$

Observación: La relación de equivalencia definida anteriormente particiona el conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ en las clases de equivalencia, que se denotan por

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim := \text{conjunto cociente}$$

Definición 40 Dado $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, se define el conjunto cociente

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim := \left\{ \left[\frac{a}{b} \right] \mid \frac{a}{b} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \right\}$$

donde

$$\left[\frac{a}{b} \right] := \left\{ \frac{c}{d} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid \frac{c}{d} \sim \frac{a}{b} \right\}.$$

Notación: Para una mayor comodidad, denotamos

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim = \mathbb{Q}$$

y $\mathbb{Q}$ se llama el conjunto de los números racionales.

4.1. Suma y Producto en $\mathbb{Q}$

Propiedad 130 Sean $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{c_1}{d_1}, \frac{c_2}{d_2} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, tales que $\frac{a_1}{b_1} \sim \frac{a_2}{b_2}$ y $\frac{c_1}{d_1} \sim \frac{c_2}{d_2}$ entonces

$$\frac{a_1d_1 + c_1b_1}{b_1d_1} \sim \frac{a_2d_2 + c_2b_2}{b_2d_2} \quad \text{y} \quad \frac{a_1c_1}{b_1d_1} \sim \frac{a_2c_2}{b_2d_2}$$

Demostración: Sean $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{c_1}{d_1}, \frac{c_2}{d_2} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, tales que

$$\frac{a_1}{b_1} \sim \frac{a_2}{b_2} \quad \text{y} \quad \frac{c_1}{d_1} \sim \frac{c_2}{d_2}$$

Luego se tiene que

$$a_1b_2 = a_2b_1 \quad \text{y} \quad c_1d_2 = c_2d_1$$

Ahora formaremos la Suma:

$$\begin{aligned} (a_1d_1 + c_1b_1)b_2d_2 &= a_1d_1b_2d_2 + c_1b_1b_2d_2 \\ &= (a_1b_2)d_1d_2 + (c_1d_2)b_1b_2 \\ &= (a_2b_1)d_1d_2 + (c_2d_1)b_1b_2 \\ &= (a_2d_2(b_1d_1) + c_2b_2(d_1b_1)) \\ &= (a_2d_2 + c_2b_2)d_1b_1 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$(a_1d_1 + c_1b_1)b_2d_2 = (a_2d_2 + c_2b_2)d_1b_1$$

de lo cual obtenemos que

$$\frac{a_1d_1 + c_1b_1}{b_1d_1} \sim \frac{a_2d_2 + c_2b_2}{b_2d_2}$$

Ahora veremos la multiplicación

$$\begin{aligned} (a_1c_1)(b_2d_2) &= (a_1b_2)(c_1d_2) \\ &= (a_2b_1)(c_2d_1) \\ &= a_2c_2b_1d_1. \end{aligned}$$

De esta manera tenemos que

$$(a_1c_1)(b_2d_2) = a_2c_2b_1d_1.$$

es decir,

$$\frac{a_1c_1}{b_1d_1} \sim \frac{a_2c_2}{b_2d_2}$$

□

El teorema nos permite definir la suma y el producto

Definición 41 Sean $\left[\frac{a}{b}\right]$ y $\left[\frac{c}{d}\right] \in \mathbb{Q}$

Adición en $\mathbb{Q}$: Se define la adición en $\mathbb{Q}$ por

$$\left[\frac{a}{b}\right] + \left[\frac{c}{d}\right] := \left[\frac{ad + bc}{bd}\right].$$

Producto $\mathbb{Q}$: Se define la multiplicación en $\mathbb{Q}$ por:

$$\left[\frac{a}{b}\right] \cdot \left[\frac{c}{d}\right] := \left[\frac{ac}{bd}\right].$$

4.1.1. Suma de Números Racionales

Propiedad 131 Los números racionales con la suma forman un grupo abeliano

$(\mathbb{Q}, +)$ es un grupo abeliano.

Demostración: Sean $\left[\frac{a_1}{b_1}\right], \left[\frac{a_2}{b_2}\right], \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \in \mathbb{Q}$.

Asociativa:

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left(\left[\frac{a_2}{b_2}\right] + \left[\frac{a_3}{b_3}\right]\right) = \left(\left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left[\frac{a_2}{b_2}\right]\right) + \left[\frac{a_3}{b_3}\right].$$

Para ellos

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left(\left[\frac{a_2}{b_2}\right] + \left[\frac{a_3}{b_3}\right]\right) &= \left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left(\left[\frac{a_2b_3 + a_3b_2}{b_2b_3}\right]\right) \\ &= \left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left[\frac{a_2b_3 + a_3b_2}{b_2b_3}\right] \\ &= \left[\frac{a_1b_2b_3 + a_2b_1b_3 + a_3b_1b_2}{b_1b_2b_3}\right] \\ &= \left[\frac{(a_1b_2 + a_2b_1)b_3 + a_3b_1b_2}{b_1b_2b_3}\right] \\ &= \left[\frac{a_1b_2 + a_2b_1}{b_1b_2}\right] + \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \\ &= \left(\left[\frac{a_1b_2 + a_2b_1}{b_1b_2}\right]\right) + \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \\ &= \left(\left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left[\frac{a_2}{b_2}\right]\right) + \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \end{aligned}$$

Por lo tanto la operación suma es asociativa.

Neutro Aditivo: Sean $\left[\frac{0}{1}\right] \in \mathbb{Q}$ y cumple con

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] + \left[\frac{0}{1}\right] = \left[\frac{a_1}{b_1}\right]$$

Lo cual se comprueba del siguiente modo

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1} \right] + \left[\frac{0}{1} \right] &= \left[\frac{a_1 \cdot 1 + 0 \cdot b_1}{b_1 \cdot 1} \right] \\ &= \left[\frac{a_1}{b_1} \right] \end{aligned}$$

luego tenemos que el neutro aditivo existe y es

$$\left[\frac{0}{b} \right] = \left[\frac{0}{1} \right] \quad \text{con } b \in \mathbb{Z}^*$$

Inverso Aditivo: Dado $\left[\frac{a_1}{b_1} \right]$ existe $\left[\frac{-a_1}{b_1} \right] \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\left[\frac{a_1}{b_1} \right] + \left[\frac{-a_1}{b_1} \right] = \left[\frac{0}{1} \right]$$

Justifiquemos lo anterior

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1} \right] + \left[\frac{-a_1}{b_1} \right] &= \left[\frac{a_1 b_1 + (-a_1) b_1}{b_1 b_1} \right] \\ &= \left[\frac{0}{b_1 b_1} \right] = \left[\frac{0}{1} \right] \end{aligned}$$

Lo anterior demuestra que existe el inverso aditivo, de esta manera tenemos que el inverso aditivo de $\left[\frac{a_1}{b_1} \right]$ es $\left[\frac{-a_1}{b_1} \right]$

Conmutatividad: Debemos probar que

$$\left[\frac{a_1}{b_1} \right] + \left[\frac{a_2}{b_2} \right] = \left[\frac{a_2}{b_2} \right] + \left[\frac{a_1}{b_1} \right]$$

Para ello

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1} \right] + \left[\frac{a_2}{b_2} \right] &= \left[\frac{a_2 b_1 + a_1 b_2}{b_1 b_2} \right] \\ &= \left[\frac{a_2}{b_2} \right] + \left[\frac{a_1}{b_1} \right]. \end{aligned}$$

Luego la suma es conmutativa.

Notación: Sean $\left[\frac{a}{b} \right]$ y $\left[\frac{c}{d} \right] \in \mathbb{Q}$, entonces

$$\left[\frac{a}{b} \right] - \left[\frac{c}{d} \right] = \left[\frac{a}{b} \right] + \left[\frac{-c}{d} \right]$$

4.1.2. Multiplicación de Números Racionales

Propiedad 132 *Los números racionales con las propiedades de la multiplicación forman un grupo abeliano.*

$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ es un grupo abeliano,

donde $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$.

Demostración: Sean $\left[\frac{a_1}{b_1}\right], \left[\frac{a_2}{b_2}\right], \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \in \mathbb{Q}$

Asociativa:

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left(\left[\frac{a_2}{b_2}\right] \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right]\right) = \left(\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_2}{b_2}\right]\right) \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right].$$

Para ellos

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left(\left[\frac{a_2}{b_2}\right] \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right]\right) &= \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left(\left[\frac{a_2 a_3}{b_2 b_3}\right]\right) \\ &= \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_2 a_3}{b_2 b_3}\right] \\ &= \left[\frac{a_1 a_2 a_3}{b_1 b_2 b_3}\right] \\ &= \left[\frac{a_1 a_2}{b_1 b_2}\right] \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \\ &= \left(\left[\frac{a_1 a_2}{b_1 b_2}\right]\right) \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \\ &= \left(\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_2}{b_2}\right]\right) \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \end{aligned}$$

Luego la multiplicación es asociativa.

Neutro multiplicativo: Existe $\left[\frac{1}{1}\right] \in \mathbb{Q}$ que cumple

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{1}{1}\right] = \left[\frac{a_1}{b_1}\right]$$

Lo cual se comprueba del siguiente modo

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{1}{1}\right] &= \left[\frac{a_1 1}{b_1 1}\right] \\ &= \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \end{aligned}$$

luego tenemos que el neutro aditivo existe y es

$$\left[\frac{a}{a}\right] = \left[\frac{1}{1}\right] \quad \text{con } a \in \mathbb{Z}^*$$

Inverso multiplicativo: Sean $\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \in \mathbb{Q}^*$ luego existe $\left[\frac{b_1}{a_1}\right] \in \mathbb{Q}^*$ que cumple

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{b_1}{a_1}\right] = \left[\frac{1}{1}\right]$$

Justifiquemos lo anterior

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{b_1}{a_1}\right] &= \left[\frac{a_1 b_1}{a_1 b_1}\right] \\ &= \left[\frac{1}{1}\right] \end{aligned}$$

Lo anterior demuestra que existe el inverso multiplicativo, de esta manera tenemos que el inverso de $\left[\frac{a_1}{b_1}\right]$ es $\left[\frac{b_1}{a_1}\right]$

Conmutatividad: Debemos probar que

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_2}{b_2}\right] = \left[\frac{a_2}{b_2}\right] \cdot \left[\frac{a_1}{b_1}\right]$$

Para ello

$$\begin{aligned} \left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_2}{b_2}\right] &= \left[\frac{a_1 a_2}{b_1 b_2}\right] \\ &= \left[\frac{a_2 a_1}{b_2 b_1}\right] \\ &= \left[\frac{a_2}{b_2}\right] \cdot \left[\frac{a_1}{b_1}\right]. \end{aligned}$$

Luego el producto es conmutativo □

Notación: Sean $\left[\frac{a}{b}\right]$ y $\left[\frac{c}{d}\right] \in \mathbb{Q}^*$, entonces

$$\left[\frac{a}{b}\right] : \left[\frac{c}{d}\right] = \left[\frac{a}{b}\right] \cdot \left[\frac{d}{c}\right].$$

Teorema 133 *El conjunto de los números racionales, con la suma y producto definidos anteriores $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, es un cuerpo.*

Demostración: Se ha demostrado anteriormente que $(\mathbb{Q}, +)$ y $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ son grupos abelianos, luego falta ver la distributividad

Distributividad: Sean $\left[\frac{a_1}{b_1}\right], \left[\frac{a_2}{b_2}\right], \left[\frac{a_3}{b_3}\right] \in \mathbb{Q}$, entonces se cumple

$$\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left(\left[\frac{a_2}{b_2}\right] + \left[\frac{a_3}{b_3}\right]\right) = \left(\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_2}{b_2}\right]\right) + \left(\left[\frac{a_1}{b_1}\right] \cdot \left[\frac{a_3}{b_3}\right]\right)$$

Veamos

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{a_1}{b_1} \right] \cdot \left(\left[\frac{a_2}{b_2} \right] + \left[\frac{a_3}{b_3} \right] \right) &= \left[\frac{a_1}{b_1} \right] \cdot \left(\left[\frac{a_2 b_3 + a_3 b_2}{b_2 b_3} \right] \right) \\
 &= \left[\frac{a_1}{b_1} \right] \cdot \left[\frac{a_2 b_3 + a_3 b_2}{b_2 b_3} \right] \\
 &= \left[\frac{a_1 a_2 b_3 + a_1 a_3 b_2}{b_1 b_2 b_3} \right] \\
 &= \left[\frac{a_1 a_2}{b_1 b_2} \right] + \left(\left[\frac{a_1 a_3}{b_1 b_3} \right] \right) \\
 &= \left(\left[\frac{a_1}{b_1} \right] \cdot \left[\frac{a_2}{b_2} \right] \right) + \left(\left[\frac{a_1}{b_1} \right] \cdot \left[\frac{a_3}{b_3} \right] \right)
 \end{aligned}$$

Observación: Luego de haber definido el conjunto de los números racionales o $\mathbb{Q}$, el no contiene todos los números que necesitamos por ejemplo la ecuación $x^2 = 5$ no tiene solución en $\mathbb{Q}$, es decir, el número que en forma habitual se denotado por $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

Propiedad 134 Sea $p \in \mathbb{Z}$ un número primo entonces el número $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

Demostración: Para este caso la demostración la realizaremos por el método del absurdo que consiste en suponer como cierto la negación de la proposición como sigue:

Supongamos que la ecuación $x^2 = \left[\frac{p}{1} \right]$ tiene solución en $\mathbb{Q}$, entonces la solución se puede representar como una fracción

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{p}{1} \right] &= \left(\left[\frac{a}{b} \right] \right)^2 \text{ donde } (a, b) = 1 \\
 \text{Luego, } \frac{p}{1} &\sim \frac{a^2}{b^2} \\
 pb^2 &= a^2
 \end{aligned}$$

Luego $p|a^2$, es decir $p|a$. Por lo tanto $a = pk$ con $k \in \mathbb{Z}$ reemplazando

$$\begin{aligned}
 pb^2 &= p^2 k^2 \\
 b^2 &= pk^2
 \end{aligned}$$

Por la justificación similar a la anterior $p|b^2$ es decir $p|b$, lo cual es una contradicción ya que $(a, b) = 1$. Por lo tanto

$$\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$$

□

Notación: A cada número racional

$$\left[\frac{a}{b} \right] = \left\{ \frac{x}{y} \mid \frac{x}{y} \sim \frac{a}{b} \right\}$$

lo denotaremos simplemente $\frac{a}{b}$.

Debemos tener claridad en la diferencia entre fracción y número racional ya que en este caso nos refiriendo a la clase.

Por ejemplo las fracciones $\frac{5}{15}$, $\frac{1}{3}$ no son iguales, pero como números racional si son iguales las clases, ya que $\frac{5}{15} \sim \frac{1}{3}$.

4.1.3. Expresión decimal en $\mathbb{Q}$.

Dado un número racional $\frac{a}{b}$, luego aplicamos el algoritmo de la división y obtenemos

$$a = bq + r, \quad \text{con } 0 \leq r < b$$

si volvemos aplicar el algoritmo de la división obtenemos

$$\begin{aligned} 10 \cdot r &= bq_1 + r_1, & \text{con } 0 \leq r_1 < b \\ 10 \cdot r_1 &= bq_2 + r_2, & \text{con } 0 \leq r_2 < b \\ &\vdots \\ 10 \cdot r_t &= bq_{t+1} + r_{t+1}, & \text{con } 0 \leq r_{t+1} < b \end{aligned}$$

como los posibles resto r_i son finito, luego en algún momento es 0 o se repite, de lo cual obtenemos que los números racionales se representan por números decimales finito o los números decimales infinitos periódicos, es decir,

$$\frac{a}{b} = q_1, q_2 q_3 \dots q_t \quad \text{o bien} \quad \frac{a}{b} = \frac{a}{b} = q_1, q_2 q_3 \dots \overline{q_s \dots q_t}$$

Ejemplo de ello tenemos

$$\frac{1}{4} = 0,25 \quad \frac{1}{3} = 0,\overline{3}$$

Existe otros números que no pertenecen a $\mathbb{Q}$, estos son los llamados números decimales infinitos no periódico o irracionales $\mathbb{I}$, ya que no se puede encontrar una representación en números racionales.

Los Números Reales

Con los conjuntos de los números racionales e irracionales que denotamos como $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ respectivamente, podemos construir un nuevo conjunto que se puede crear a partir de estos dos. Estos nuevos elementos los llamaremos números reales y algunos elementos que pertenecen a este conjunto son

$$\pi; \sqrt{3}; 0,1; 5,\overline{6}; \dots$$

En este conjunto existe un producto y una suma compatible con de $\mathbb{Q}$, que entrega la siguiente propiedad

Teorema 135 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un cuerpo.

4.2. Extensiones Cuadráticas de los Racionales $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Como justificamos anteriormente los números $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots \notin \mathbb{Q}$, pero si a $\mathbb{Q}$ le agregamos estos números lo que tenemos como resultado son cuerpos intermedios llamados extensiones cuadráticas debido a que vienen dados por raíces cuadráticas.

Observación: De los números anterior existe algunos de ellos que pueden ser representados por el llamado espiral pitagórica, que se inicia con un triángulo isosceles, con lados de longitud 1, y el siguiente triángulo rectángulo de altura 1 y base la hipotenusa del anterior, como en la figura.

Definición 42 Sea $p \in \mathbb{Z}$, tal que $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$

Se define $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ por

$$\mathbb{Q}[\sqrt{p}] := \{a + b\sqrt{p} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Observación: Notemos que dado un número $x \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, existe únicos elementos $a, b \in \mathbb{Q}$, tal que $x = a + b\sqrt{p}$.

Si suponemos que existe dos expresiones distintas $a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p}$, obtenemos una contradicción con que $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. Esta observación nos permite definir las siguientes operaciones binarias.

4.2.1. Suma y Producto en $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Sean $a_1 + b_1\sqrt{p}, a_2 + b_2\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$. Se define las siguientes operaciones:

Suma:

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) + (a_2 + b_2\sqrt{p}) := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p}$$

Producto:

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p}) := (a_1a_2 + pb_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{p}$$

Propiedades de la Suma en $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Propiedad 136 *La extensión cuadrática con la operación suma es un grupo abeliano, es decir,*

$$(\mathbb{Q}[\sqrt{p}], +) \quad \text{es un grupo abeliano}$$

Demostración: Recuerde que $(\mathbb{Q}, +)$ es un grupo abeliano.

Sean $a_1 + b_1\sqrt{p}$, $a_2 + b_2\sqrt{p}$, $a_3 + b_3\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

Asociativa:

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) + [(a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_3 + b_3\sqrt{p})] = [(a_1 + b_1\sqrt{p}) + (a_2 + b_2\sqrt{p})] + (a_3 + b_3\sqrt{p})$$

Para ello,

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) + [(a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_3 + b_3\sqrt{p})] &= (a_1 + b_1\sqrt{p}) + [(a_2 + a_3) + (b_2 + b_3)\sqrt{p}] \\ &= (a_1 + a_2 + a_3) + (b_1 + b_2 + b_3)\sqrt{p} \\ &= [(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p}] + (a_3 + b_3\sqrt{p}). \\ &= [(a_1 + b_2)\sqrt{p}] + (a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_3 + b_3\sqrt{p}). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la operación suma es asociativa

Neutro Aditivo: Existe $0 + 0\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

Que cumple con:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) + (0 + 0\sqrt{p}) &= (a_1 + 0) + (b_1 + 0)\sqrt{p} \\ &= a_1 + b_1\sqrt{p} \end{aligned}$$

luego el neutro aditivo existe y es $0 = 0 + 0\sqrt{p}$.

Inverso Aditivo: Sea $a_1 + b_1\sqrt{p}$, existe $(-a_1) + (-b_1)\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ que cumple con

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) + ((-a_1) + (-b_1)\sqrt{p}) = 0 + 0\sqrt{p}$$

Comprobemos lo anterior

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) + ((-a_1) + (-b_1)\sqrt{p}) &= (a_1 + (-a_1)) + (b_1 + (-b_1))\sqrt{p} \\ &= 0 + 0\sqrt{p} \end{aligned}$$

Lo anterior demuestra que existe el inverso aditivo de $a_1 + b_1\sqrt{p}$ es $(-a_1) + (-b_1)\sqrt{p}$.

Conmutatividad: Debemos probar

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) + (a_2 + b_2\sqrt{p}) = (a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_1 + b_1\sqrt{p})$$

Para ello

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) + (a_2 + b_2\sqrt{p}) &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p} \\ &= (a_2 + a_1) + (b_2 + b_1)\sqrt{p} \\ &= (a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_1 + b_1\sqrt{p}). \end{aligned}$$

□

Propiedad del Producto en $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Propiedad 137 El conjunto $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ con la multiplicación forman un grupo abeliano

$$(\mathbb{Q}^*[\sqrt{p}], \cdot) \quad \text{es un grupo abeliano}$$

donde $\mathbb{Q}^*[\sqrt{p}]$ es $\mathbb{Q}[\sqrt{p}] - \{0\}$.

Demostración: Sean $a_1 + b_1\sqrt{p}$, $a_2 + b_2\sqrt{p}$, $a_3 + b_3\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

Asociativa:

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot [(a_2 + b_2\sqrt{p}) \cdot (a_3 + b_3\sqrt{p})] = [(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p})] \cdot (a_3 + b_3\sqrt{p})$$

Para ello

$$\begin{aligned} & (a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot [(a_2 + b_2\sqrt{p}) \cdot (a_3 + b_3\sqrt{p})] \\ &= (a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot [(a_2a_3 + pb_2b_3) + (a_3b_2 + a_2b_3)\sqrt{p}] \\ &= [a_1(a_2a_3 + pb_2b_3) + pb_1(a_3b_2 + a_2b_3)] + [a_1(a_3b_2 + a_2b_3) + (a_2a_3 + pb_2b_3)b_1]\sqrt{p} \\ &= (a_1a_2a_3 + a_1pb_2b_3 + a_3b_2b_1p + a_2b_3b_1p) + (a_1a_3b_2 + a_1a_2b_3 + a_2a_3b_1 + pb_1b_2b_3)\sqrt{p} \\ &= [(a_1a_2 + b_2b_1p)a_3 + (a_1b_2 + a_2b_1)b_3p] + [(a_1a_2 + pb_1b_2)b_3 + a_3(a_1b_2 + a_2b_1)]\sqrt{p} \\ &= [(a_1a_2 + b_2b_1p) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{p}](a_3 + b_3\sqrt{p}) \\ &= [(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p})] \cdot (a_3 + b_3\sqrt{p}) \end{aligned}$$

Por lo tanto el producto es asociativo.

Neutro Multiplicativo: Existe $1 + 0\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, tal que

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (1 + 0\sqrt{p}) = a_1 + b_1\sqrt{p}$$

Lo cual se comprueba del siguiente modo

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (1 + 0\sqrt{p}) &= (a_1 \cdot 1 + p \cdot 0 \cdot b_1) + (a_1 \cdot 0 + 1 \cdot b_1)\sqrt{p} \\ &= a_1 + b_1\sqrt{p} \end{aligned}$$

luego tenemos que el neutro multiplicativo existe y es

$$1 = 1 + 0\sqrt{p}.$$

Inverso Multiplicativo: Sean $a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}^*[\sqrt{p}]$, en primer lugar notemos que $a^2 - b^2p \neq 0$, propiedad 134, luego existe $\frac{a}{a^2 - b^2p} + \frac{-b}{a^2 - b^2p}\sqrt{p} \in \mathbb{Q}^*[\sqrt{p}]$ que cumple con

$$(a + b\sqrt{p}) \cdot \left(\frac{a}{a^2 - b^2p} + \frac{-b}{a^2 - b^2p}\sqrt{p} \right) = 1 + 0\sqrt{p}$$

La prueba de lo anterior esta dada por

$$\begin{aligned}
 & (a + b\sqrt{p}) \cdot \left(\frac{a}{a^2 - b^2p} + \frac{-b}{a^2 - b^2p} \sqrt{p} \right) \\
 = & \left(a \frac{a}{a^2 - b^2p} + pb \frac{-b}{a^2 - b^2p} \right) + \left(a \frac{-b}{a^2 - b^2p} + \frac{a}{a^2 - b^2p} b \right) \sqrt{p} \\
 = & \frac{a^2 - b^2p}{a^2 - b^2p} + \frac{-ba + ba}{a^2 - b^2p} \sqrt{p} \\
 = & 1 + 0\sqrt{p}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto el inverso multiplicativo de $a + b\sqrt{p}$ es

$$\frac{a}{a^2 - pb^2} + \frac{-b}{a^2 - pb^2} \sqrt{p}.$$

Conmutatividad: Debemos probar

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p}) = (a_2 + b_2\sqrt{p}) \cdot (a_1 + b_1\sqrt{p})$$

Para ello

$$\begin{aligned}
 (a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p}) &= (a_1a_2 + pb_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{p} \\
 &= (a_2a_1 + pb_2b_1) + (a_2b_1 + a_1b_2)\sqrt{p} \\
 &= (a_2 + b_2\sqrt{p}) \cdot (a_1 + b_1\sqrt{p}).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto la multiplicación en $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ es conmutativa. □

Notación: $a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, $c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}^*[\sqrt{p}]$ entonces

$$(a + b\sqrt{p}) : (c + d\sqrt{p}) = (a + b\sqrt{p}) \cdot (c + d\sqrt{p})^{-1}$$

Teorema 138 $(\mathbb{Q}[\sqrt{p}], +, \cdot)$ es un cuerpo.

Demostración: Se ha demostrado anteriormente que $(\mathbb{Q}[\sqrt{p}], +)$ y $(\mathbb{Q}^*[\sqrt{p}], \cdot)$ son grupos abelianos, luego falta ver la distributividad es decir, debemos demostrar

$a_1 + b_1\sqrt{p}, a_2 + b_2\sqrt{p}, a_3 + b_3\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ tenemos

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot [(a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_3 + b_3\sqrt{p})] = [(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_3 + b_3\sqrt{p})].$$

Veamos

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot [(a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_3 + b_3\sqrt{p})] = (a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot [(a_2 + a_3) + (b_2 + b_3)\sqrt{p}]$$

lo que es igual a

$$\begin{aligned}
 & (a_1(a_2 + a_3) + pb_1(b_2 + b_3)) + (a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3))\sqrt{p} \\
 = & (a_1a_2 + a_1a_3 + pb_1b_2 + pb_1b_3) + (a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1)\sqrt{p} \\
 = & (a_1a_2 + pb_1b_2 + a_1a_3 + pb_1b_3) + (a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_3b_1)\sqrt{p} \\
 = & ((a_1a_2 + pb_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{p}) + ((a_1a_3 + pb_1b_3) + (a_1b_3 + a_3b_1)\sqrt{p}) \\
 = & [(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{p})] + [(a_1 + b_1\sqrt{p}) \cdot (a_3 + b_3\sqrt{p})].
 \end{aligned}$$

Ejemplo 106 Resolver en $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, la ecuación

$$(2 + 3\sqrt{5})x = 3 - \sqrt{5}$$

Solución: Como sabemos, el inverso se obtiene del siguiente modo

$$(2 + 3\sqrt{5})^{-1} = \frac{2}{4 - 5 \cdot 9} - \frac{3}{4 - 5 \cdot 9} \sqrt{5} = -\frac{2}{41} + \frac{3}{41} \sqrt{5}$$

luego se tiene que

$$x = (3 - \sqrt{5})\left(-\frac{2}{41} + \frac{3}{41} \sqrt{5}\right) = \left(-3\frac{2}{41} + 5 \cdot (-1)\frac{3}{41}\right) + \left(3\frac{3}{41} - \frac{2}{41}(-1)\right)\sqrt{5}$$

Por lo tanto,

$$x = -\frac{21}{41} + \frac{11}{41} \sqrt{5}$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ -\frac{21}{41} + \frac{11}{41} \sqrt{5} \right\}$$

Ejemplo 107 Resolver en $\mathbb{Q}[\sqrt{7}]$, el sistema ecuaciones

$$\begin{cases} (2 + \sqrt{7})x + y = 3 + \sqrt{7} \\ (3 - \sqrt{7})x + \sqrt{7}y = 1 \end{cases}$$

Solución: Amplifiquemos la primera ecuación

$$\begin{cases} (2 + \sqrt{7})x + y = 3 + \sqrt{7} & / \cdot -\sqrt{7} \\ (3 + \sqrt{7})x + \sqrt{7}y = 1 \end{cases}$$

Obtenemos

$$\begin{cases} (-7 - 2\sqrt{7})x - \sqrt{7}y = -7 - 3\sqrt{7} \\ (3 + \sqrt{7})x + \sqrt{7}y = 1 \end{cases}$$

Sumando obtenemos

$$\begin{aligned} (-4 - \sqrt{7})x &= -6 - 3\sqrt{7} \\ x &= (-6 - 3\sqrt{7})(-4 - \sqrt{7})^{-1} \\ x &= (-6 - 3\sqrt{7})\left(\frac{-4}{9} + \frac{1}{9}\sqrt{7}\right) \\ x &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{7} \end{aligned}$$

Reemplazando en la primera ecuación obtenemos

$$\begin{aligned} y &= 3 + \sqrt{7} - (2 + \sqrt{7})\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{7}\right) \\ y &= 3 + \sqrt{7} - \left(\frac{16}{3} + \frac{5}{3}\sqrt{7}\right) \\ y &= -\frac{7}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{7} \end{aligned}$$

Luego, el conjunto solución del sistema es

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{7}, -\frac{7}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{7} \right) \right\}$$

4.2.2. Conjugación de $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Definición 43 Sea $a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Se define el conjugación de $a + b\sqrt{p}$ por $a - b\sqrt{p}$ y se denota de la siguiente forma:

$$\overline{a + b\sqrt{p}} := a - b\sqrt{p}.$$

Observación: La conjugación es una función dada por

$$\begin{aligned} \overline{} &: \mathbb{Q}[\sqrt{p}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{p}] \\ a + b\sqrt{p} &\mapsto \overline{a + b\sqrt{p}} = a - b\sqrt{p}. \end{aligned}$$

Cumple las siguientes propiedades

Teorema 139 Sean $a + b\sqrt{p}, c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

$$(i) \quad \overline{(a + b\sqrt{p}) + (c + d\sqrt{p})} = \overline{(a + b\sqrt{p})} + \overline{(c + d\sqrt{p})}.$$

$$(ii) \quad \overline{(a + b\sqrt{p}) \cdot (c + d\sqrt{p})} = \overline{(a + b\sqrt{p})} \cdot \overline{(c + d\sqrt{p})}.$$

$$(iii) \quad \overline{a + b\sqrt{p}} = a + b\sqrt{p} \quad \text{si y sólo si} \quad b = 0.$$

Demostración:

(i) Sean $a + b\sqrt{p}, c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, luego

$$\begin{aligned} \overline{(a + b\sqrt{p}) + (c + d\sqrt{p})} &= \overline{(a + c) + (b + d)\sqrt{p}} \\ &= (a + c) - (b + d)\sqrt{p} \\ &= (a + c) + ((-b) + (-d))\sqrt{p} \\ &= \overline{(a - b\sqrt{p})} + \overline{(c - d\sqrt{p})} \\ &= \overline{a + b\sqrt{p}} + \overline{c + d\sqrt{p}}. \end{aligned}$$

(ii) Sean $a + b\sqrt{p}, c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, tenemos

$$\begin{aligned} \overline{(a + b\sqrt{p}) \cdot (c + d\sqrt{p})} &= \overline{(ac + pbd) + (ad + bc)\sqrt{p}} \\ &= ((ac + pbd) - (ad + bc)\sqrt{p}) \\ &= (ac + (-b)(-d)) + (a(-d) + (-b)c)\sqrt{p} \\ &= \overline{(a - b\sqrt{p}) \cdot (c - d\sqrt{p})} \\ &= \overline{a + b\sqrt{p}} \cdot \overline{c + d\sqrt{p}}. \end{aligned}$$

(iii) Sea $a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, luego

$$\overline{a + b\sqrt{p}} = a - b\sqrt{p}$$

pero a, b son únicos luego

$$a = a \vee b = -b$$

Por lo tanto, $b = 0$

4.2.3. La Norma de $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Definición 44 Sea $a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, se define la norma de $a + b\sqrt{p}$ por $a^2 - b^2p$ y se denota por

$$\| a + b\sqrt{p} \| := a^2 - b^2p.$$

Observación: La norma es una función dada por

$$\begin{aligned} \| \| & : \mathbb{Q}[\sqrt{p}] & \rightarrow & \mathbb{Q} \\ a + b\sqrt{p} & \mapsto & \| a + b\sqrt{p} \| = & a^2 - b^2p. \end{aligned}$$

Teorema 140 Sean $a + b\sqrt{p}, c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

i)

$$\| \overline{(a + b\sqrt{p})} \| = \| a + b\sqrt{p} \|$$

ii)

$$\| (a + b\sqrt{p}) \| = (a + b\sqrt{p}) \overline{(a + b\sqrt{p})}$$

iii)

$$\| (a + b\sqrt{p}) \cdot (c + d\sqrt{p}) \| = \| a + b\sqrt{p} \| \cdot \| c + d\sqrt{p} \|$$

Demostración: Sean $a + b\sqrt{p}, c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, luego

$$\begin{aligned} \| (a + b\sqrt{p}) \cdot (c + d\sqrt{p}) \| &= \| (ac + pbd) + (ad + bd)\sqrt{p} \| \\ &= (ac + pbd)^2 - (ad + bd)^2p \\ &= a^2c^2 + 2acpbd + p^2b^2d^2 - (a^2d^2 + 2adcb + c^2b^2)p \\ &= a^2c^2 + 2acpbd + p^2b^2d^2 - a^2d^2p - 2adcbp - c^2b^2p \\ &= a^2c^2 + p^2b^2d^2 - a^2d^2p - c^2b^2p \\ &= (a^2 - pb^2) \cdot (c^2 - pd^2) \\ &= \| a + b\sqrt{p} \| \cdot \| c + d\sqrt{p} \| \end{aligned}$$

4.2.4. Anillo de Enteros de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

Definición 45 Se define $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ igual a

$$\mathbb{Z}[\sqrt{p}] := \{a + b\sqrt{p} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Observación: Dadas las contenciones anteriores se tiene que

$$\mathbb{Z}[\sqrt{p}] \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$$

Luego el conjugado y norma están definidas, más aún

$$\begin{aligned} \| \| & : \mathbb{Z}[\sqrt{p}] & \rightarrow & \mathbb{Z} \\ a + b\sqrt{p} & \mapsto & \| a + b\sqrt{p} \| := & a^2 - b^2p. \end{aligned}$$

Teorema 141 $(\mathbb{Z}[\sqrt{p}], +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.

Definición 46 Sea $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, se dice que u es una unidad de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, si y sólo si existe un elemento $v \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, tal que $uv = 1$.

Notación: Denotaremos el conjunto unidad de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ por $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$

Ejemplo 108 Determine en cada caso si el elemento es

1. $3 + 2\sqrt{2}$ es un unidad $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$

2. $3 + 2\sqrt{3}$ es un unidad $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$

Solución: 1. Supongamos $3 + 2\sqrt{2}$ es un unidad, luego existe $x + y\sqrt{2}$ tal que

$$\begin{aligned} (3 + 2\sqrt{2})(x + y\sqrt{2}) &= 1 + 0\sqrt{2} \\ (3x + 4y) + (3y + 2x)\sqrt{2} &= 1 + 0\sqrt{2} \end{aligned}$$

De lo cual obtenemos, el siguiente sistema

$$\left. \begin{aligned} 3x + 4y &= 1 / \cdot 2 \\ 2x + 3y &= 0 / \cdot -3 \end{aligned} \right|$$

Sumando las ecuaciones obtenemos $-y = 2$, es decir $y = -2$. reemplazando obtenemos $x = 3$,

$$(3 + 2\sqrt{2})^{-1} = 3 - 2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$$

luego tenemos $3 + 2\sqrt{2} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$.

2. Supongamos ahora que $3 + 2\sqrt{3}$ es un unidad, luego existe $x + y\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ tal que

$$\begin{aligned} (3 + 2\sqrt{3})(x + y\sqrt{3}) &= 1 + 0\sqrt{3} \\ (3x + 6y) + (3y + 2x)\sqrt{3} &= 1 + 0\sqrt{3} \end{aligned}$$

De lo cual obtenemos

$$\left. \begin{aligned} 3x + 6y &= 1 \\ 2x + 3y &= 0 \end{aligned} \right|$$

Pero la primera ecuación nos entrega que $3|1$, lo que es una contradicción. Por tanto tenemos $3 + 2\sqrt{3} \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{3}])$.

Propiedad 142 $a + b\sqrt{p} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$ si y sólo si $\|a + b\sqrt{p}\| \in \{1, -1\}$

Demostración: Supongamos que $a + b\sqrt{p}$ es una unidad, luego existe $x + y\sqrt{p}$ tal que

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{p})(x + y\sqrt{p}) &= 1 + 0\sqrt{p} / \| \| \\ \|(a + b\sqrt{p})(x + y\sqrt{p})\| &= \|1 + 0\sqrt{p}\| \\ \|a + b\sqrt{p}\| \|x + y\sqrt{p}\| &= 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\|a + b\sqrt{p}\|$ es unidad en $\mathbb{Z}$, por ende $\|a + b\sqrt{p}\| \in \{1, -1\}$.

En el otro sentido, supongamos que $\|a + b\sqrt{p}\| = 1$, podemos comprobar que

$$(a + b\sqrt{p})(a - b\sqrt{p}) = (a^2 - bp^2) + (-ab + ab)\sqrt{p} = 1 + 0\sqrt{p}$$

Propiedad 143 $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}]), \cdot)$ es un grupo abeliano.

Observación: Note que los conjuntos anteriores incluido las operaciones, también es posible construirlos del siguiente modo, en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ o en $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, se define las siguientes operaciones

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) \\ (a, b) \cdot (c, d) &= (ac + bdp, ad + bc)\end{aligned}$$

y con ellos tenemos la misma estructura, sin incorporar el símbolo $\sqrt{p}$ explícitamente.